

مطالعه اثر فیلم خوراکی ژل آلوته ورا - صمغ فارسی بر ویژگی‌های پنیر سفید ایرانی

فرناز جمشیدی¹، سمیه رحیمی²، وجیهه فدائی نوغانی³

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2- نویسنده مسئول: استادیار، گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
پست الکترونیکی: s.rahimi@irost.com

3- گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 95/10/15

تاریخ پذیرش: 96/2/6

چکیده

سابقه و هدف: پوشش‌دهی با ترکیبات طبیعی یکی از روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی محسوب می‌شود که امروزه کاربرد گسترده‌ای یافته است. پنیر سفید ایرانی جزو محصولات غذایی محبوبی است که به دلیل نگهداری در آب نمک، مصرف روزانه آن می‌تواند سلامت مصرف کنندگان، از جمله کودکان، سالمندان، افراد مبتلا به فشار خون و غیره را تهدید کند.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش از پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی به روش غوطه‌وری با ترکیب ژل آلوته ورا (محلول 50% w/w) و صمغ فارسی (محلول 3% w/v) در سطوح مختلف جایگزینی شامل 0، 25، 50، 75 و 100% v/v به جای نگهداری در آب نمک استفاده شد. دو تیمار نیز به عنوان نمونه شاهد بدون پوشش (درون آب نمک و بدون آب نمک) در نظر گرفته شدند و سپس ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه‌ها طی نگهداری به مدت 75 روز (4°C) مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که طی نگهداری، مقدار pH و رطوبت نمونه‌ها، به طور معنی‌داری کاهش یافته در حالی که اسیدیته، افت وزن و ΔE افزایش یافت ($p < 0/05$). اثر پوشش‌دهی و ترکیب آن بر روی محتوای نمک معنی‌دار بود ($p < 0/05$) به نحوی که نمونه پوشش‌دهی شده با 100% صمغ فارسی و پس از آن نمونه پوشش‌دهی شده با 100% ژل آلوته ورا، کم‌ترین مقدار نمک را طی 75 روز نگهداری دارا بودند و پوشش‌دهی با نسبت‌های مختلف ژل آلوته ورا و صمغ فارسی، کلیه ویژگی‌های حسی نمونه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد ($p < 0/05$).

نتیجه‌گیری: پنیرهای پوشش‌دهی شده با 100% ژل آلوته ورا به دلیل کسب بالاترین امتیاز پذیرش کلی و محتوای کم نمک به عنوان بهترین ترکیب جهت پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی شناخته شدند.

واژگان کلیدی: پوشش‌دهی، ژل آلوته ورا، صمغ فارسی، پنیر سفید ایرانی

• مقدمه

فعالیت آبی، زمان ماندگاری پنیر نیز افزایش یابد (4). یکی از مسائل بسیار مهم تغذیه‌ای در پنیرها، محتوای بالای نمک موجود در آن‌هاست که علیرغم مغذی بودن پنیر از لحاظ پروتئینی، مصرف آن را برای اغلب افراد جامعه با محدودیت مواجه می‌سازد که البته پنیر سفید ایرانی نیز به دلیل طی نمودن فرآیند رسیدن آن در آب نمک، از این قاعده مستثنی نیست؛ این در حالی است که به طور کلی، بیشترین مقدار نیاز روزانه بدن به سدیم 0/2 گرم (معادل 0/5 گرم از نمک کلرید سدیم) است و میانگین کلرید سدیم جذب شده در بدن از طریق رژیم‌های غذایی در کشورهای پیشرفته، 10 تا 35 برابر

پنیر یکی از فرآورده‌های مهم شیر است که ارزش غذایی خاصی در تغذیه انسان داشته و جزو متنوع‌ترین فرآورده لبنی به سبب شکل، بافت، عطر و طعم محسوب می‌شود (1). پنیر سفید ایرانی، نوعی پنیر سفید آب نمکی است که از شیر گاو تهیه شده و پس از تهیه لخته‌ها، در آب نمک به مدت 40 الی 90 روز نگهداری می‌شود تا دوره رسیدن طی می‌شود (2). نمک مورد استفاده در تولید پنیرهای آب نمکی، با جذب آب اضافی و تکمیل آگیری دلمه، باعث افزایش قوام و استحکام دلمه می‌شود (3)؛ از طرف دیگر نگهداری پنیر در آب نمک، باعث می‌شود با کاهش آب آزاد پنیر و در نتیجه کاهش

انگلیسی و فرانسوی به ترتیب Gum Zedu و Gomme Notras می‌نامند که به غیر از مصارف طب سنتی، سالیانه مقادیر زیادی از آن با قیمت ناچیز به بسیاری از کشورها صادر می‌شود (14، 15).

در مورد پوشش‌دهی پنی‌های مختلف تاکنون تحقیقات گوناگونی در دنیا صورت پذیرفته‌اند. Kampf و Nussinovitch در پژوهشی به بررسی تأثیر پوشش‌دهی نوعی پنیر نیمه سخت با هیدروکلوئیدهای کاراگینان، آلژینات و ژلان طی 46 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد پرداختند و نشان دادند که به دلیل این که پنی‌های پوشش‌دهی شده، آب کمتری را در اثر تبخیر از دست داده بودند، بافت نرم‌تر و رنگ بهتری داشتند (16). Cerqueira و همکاران به بررسی عملکرد پوشش‌های خوراکی تهیه شده از پلی ساکاریدهای کیتوزان، گالاتومنان و آگار در پنیر سالویو (Salvio) پرداختند و نشان دادند که ترکیب کیتوزان - گالاتومنان بهترین ترکیب جهت پوشش‌دهی می‌باشد (17). Fajardo و همکاران نیز به بررسی اثرات پوشش‌دهی با کیتوزان و یا ترکیب کیتوزان - ناتاماسین در پنیر سالویو پرداختند که طی آن بر مدت زمان ماندگاری پنیر افزوده شد (18). محققان دیگری، طی پژوهشی افزایش مدت زمان ماندگاری پنیر ریکوتا پوشش‌دهی شده با ترکیب گالاتومنان - نایسین را بررسی نموده و نشان دادند که افزودن نایسین به پوشش خوراکی گالاتومنان، موجب تأخیر در رشد میکروبی شده و بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پنی‌ها نیز تأثیرگذار است (19). Di Piero و همکاران در سال 2011، به بررسی افزایش زمان ماندگاری پنیر ریکوتا پوشش‌دهی شده با فیلم خوراکی کیتوزان - پروتئین آب پنیر پرداخته و نشان دادند که طی دوره 21 روزه نگهداری، هیچ‌گونه تغییری در pH پنیر ریکوتا پوشش‌دهی شده، مشاهده نشد (20). Ramos و همکاران، به بررسی تأثیر پروتئین آب پنیر، صمغ‌گوار و روغن آفتابگردان به عنوان مخلوط پایه همراه با چندین نوع ترکیب ضد میکروبی نظیر ناتاماسین و اسیدلاکتیک به عنوان پوشش خوراکی پنیر سالویو در مدت 60 روز نگهداری پرداختند. نتایج نشان داد، بکار بردن این پوشش در بسته‌بندی پنیر باعث کاهش رطوبت، افزایش سفتی و کاهش تغییر رنگ می‌گردد (1). Medeiros و همکاران در سال 2014، در پژوهشی به بررسی خصوصیات فیزیکی یک نوع نانو روکش ارزیابی تأثیر آن در نگهداری پنیر کوآیهو (Coaiho) به مدت 20 روز پرداختند. نتایج نشان داد که ویژگی ضد باکتریایی این نانوروکش باعث شد تا مدت زمان ماندگاری پنیر افزایش یابد (21). طی پژوهشی در سال 2015، تأثیر استفاده از پوشش خوراکی آلژینات سدیم در ترکیب با نانو ذرات نقره و


بیشتر از نیاز روزانه بدن است (5، 6). طبق تحقیقات انجام شده، غلظت بالای یون کلر در آب نمک نیز برای سلامتی خطرناک بوده و موجب بیماری‌های قلبی - عروقی و کلیوی می‌شود. از طرف دیگر، علاوه بر همبستگی مثبت بین افزایش میزان مصرف نمک و بروز فشار خون بالا، افزایش سدیم در رژیم غذایی باعث افزایش دفع ادراری کلسیم نیز می‌شود که به نوبه خود کاهش سطح کلسیم را در بدن در پی دارد (5).

پوشش‌های خوراکی امروزه به عنوان یکی از فناوری‌های بالقوه محسوب می‌گردند که می‌توانند با ایجاد اطمینان از امنیت میکروبی مواد غذایی و هم چنین حفاظت آن در برابر عوامل خارجی، به منظور افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی و یا بهبود بسته بندی مورد استفاده قرار گیرند (7). فیلم‌ها و پوشش‌دهنده‌های خوراکی باید غیر سمی، خنثی، شفاف، روشن، بی بو و بی طعم باشند که در هنگام مصرف مشخص نشوند (8). از سوی دیگر، مواد مورد استفاده در تهیه فیلم‌های خوراکی باید دارای پیش نیازهایی از قبیل ویژگی‌های انتقالی (به ویژه نفوذ پذیری به بخار آب، دی اکسید کربن و اکسیژن)، خواص مکانیکی (به ویژه مقاومت در برابر کش آمدن و شکستگی)، ویژگی‌های بصری (کدورت و رنگ) و عطر و طعم (در اغلب موارد، بدون طعم) باشند (9). تاکنون مطالعات بسیاری روی استفاده از پلی ساکاریدهایی نظیر نشاسته، کیتوزان، پکتین، گوار، کاراگینان، گالاتومنان‌ها و غیره به عنوان فیلم‌های خوراکی صورت گرفته است (10).

ژل آلوئه ورا، یک ژل بیرنگ است که در قسمت‌های درونی برگ‌های گیاه آلوئه ورا (*Aloe vera*) قرار گرفته و شامل آب (بیش از 98 درصد)، انواع ترکیبات مغذی نظیر اسیدهای آمینه، ترکیبات فنلی، استرول‌های گیاهی و هم چنین پلی ساکاریدهایی نظیر پکتین، سلولز، همی سلولز، گلوکومانوز و غیره می‌باشد (11-12). ژل آلوئه ورا کاملاً سازگار با محیط زیست بوده، به راحتی در آب حل شده و قادر است به صورت یک پوشش حفاظتی با ضخامت یکنواخت روی محصول عمل نماید. به علت وجود دو ترکیب ساپونین و اسید سالیسیلیک در ژل که خاصیت ضد قارچی دارند، این پوشش می‌تواند باعث جلوگیری از رشد و تکثیر قارچ‌ها نیز شود (13).

صمغ فارسی (*Persian gum*)، تراوشات شفاف تا نیمه کدری است که از تنه و شاخه‌های درخت بادام کوهی با نام علمی *Amygdalus scoparia Spach* به دست می‌آید. بادام کوهی در ایران به طور وحشی و خودرو در مناطق ایرانی - تورانی و زاگرسی می‌روید و تراوشات صمغی آن را زدو، زد، ازدو، انگوم، قرصیا، صمغ شیرازی یا فارسی و در زبان‌های

استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیک (Caminox، اسپانیا) طبق دستورالعمل شرکت سازنده به آن اضافه گردید. با رسیدن pH شیر به 6/4، به ازای هر کیلو گرم شیر، 0/03 گرم رنت (Chy-Max، دانمارک) به مخلوط فوق اضافه و پس از گذشت حدود 30-60 دقیقه لخته‌های پنیر تشکیل شدند. پس از آبیگری کامل، دلمه‌ها به شکل بلوک‌هایی برش داده شده و به مدت 18 ساعت درون محلول آب نمک اشباع پاستوریزه (20-22% w/v) در دمای 20 درجه سانتی گراد غوطه ور شدند. در مرحله بعد قالب‌های پنیر درون ظروف پلاستیکی درب‌دار از جنس پلی پروپیلن حاوی محلول آب نمک پاستوریزه با غلظت (10% w/v) بسته بندی شده و به مدت 24 ساعت در دمای 18 درجه سانتی گراد نگهداری شدند که سپس در دمای 5-8 درجه سانتی گراد به مدت 60 روز جهت تکمیل فرآیند رسیدن، ذخیره شدند (26، 27).



شکل 1. نمودار جریان تهیه پنیر سفید ایرانی

بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده (MAP Modified Atmosphere Packaging) برای افزایش مدت زمان ماندگاری پنیر فیوردیلاته (Fiordilatte) (با یا بدون نگهداری در آب نمک) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ترکیب پوشش فوق همراه با بسته بندی MAP، تاریخ مصرف پنیر را حدوداً تا 10 روز برای نمونه هایی که در آب نمک بسته بندی شده بودند، افزایش داد (22). Cui و همکاران در سال 2016 از فیلم کیتوزان حاوی لیپوزوم‌های نایسین - سیلیکا جهت جلوگیری از رشد باکتری لیستریا مونوسیژنوز در پوشش دهی پنیر چدار استفاده نموده و نشان دادند که پوشش دهی با این فیلم می تواند به طور مؤثری مانع از رشد باکتری شود بدون آن که بر ویژگی های حسی آن تأثیرگذار باشد (23). Fuciños و همکاران از نانوهیدروژل حاوی پیماریسین برای پوشش دهی پنیر Arzuúa-Ulloa استفاده نمودند. داده ها حاکی از آن بود که طی 30 روز نگهداری، بار میکروبی تمامی نمونه های پنیر پوشش دهی شده، کمتر از نمونه شاهد بود (24). محققان در سال 2017 برای افزایش مدت زمان ماندگاری پنیر کم چرب از فیلم خوراکی تهیه شده از آلژینات سدیم حاوی نانوامولسیون روغن اساسی پونه کوهی و فیبر نارنگی استفاده نموده و نشان دادند که پوشش دهی با جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها منجر به افزایش مدت زمان ماندگاری تکه های پنیر گردید (25).

به منظور کاهش دریافت روزانه نمک و کمک به حفظ سلامت مصرف کنندگان از جمله بیماران نظیر مبتلایان به فشار خون، کودکان، سالمندان و غیره و هم چنین ارائه محصولات غذایی با کیفیت، مغذی و دارای ماندگاری طولانی، استفاده از روش های نگهداری نوین و سالم نظیر پوشش دهی برای پنیر سفید ایرانی مفید و ضروری به نظر می رسد تا بلکه بتوان با جایگزینی پوشش دهی به جای نگهداری در آب نمک، از میزان دریافت نمک توسط مصرف کنندگان کاسته و از فواید پوشش دهی نیز سود جست. لذا در این تحقیق، پنیر سفید ایرانی پس از اتمام مرحله رسیدن، با ترکیب ژل آلوئه ورا - صمغ فارسی پوشش دهی شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حسی آن طی 75 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد بررسی می شود.

• مواد و روش ها

تهیه پنیر سفید ایرانی: برای تهیه پنیر مطابق با نمودار جریان شکل 1، در ابتدا شیر کم چرب پاستوریزه تجاری (برند معتبر ایرانی) تا دمای 35 درجه سانتی گراد حرارت داده شد و سپس 0/15 گرم کلرید کلسیم (Merck، آلمان) به ازای هر کیلوگرم شیر و کشت آغازگر حاوی باکتری های

پس از تهیه ترکیب پوشش مطابق با جدول فوق، 2% روغن ذرت (Delizio، بلژیک) نیز به عنوان عامل نرم کننده (Plasticizer) و جهت بهبود قابلیت تشکیل فیلم، به آن‌ها اضافه گردید (29). سپس مطابق با شکل 2، پنیرهای رسیده به صورت نمونه‌های مکعبی با ابعاد $3 \times 3 \times 3$ سانتی متر بریده شدند و پوشش‌دهی آن‌ها به روش غوطه وری انجام گردید که طی آن، نمونه‌های پنیر به مدت 1 دقیقه درون ترکیب پوشش‌دهنده، غوطه ور شدند تا زمانی که همه سطوح پنیرها با ماده پوشش‌دهنده کاملاً پوشیده شود. آنگاه نمونه‌ها به مدت تقریبی 8 ساعت درون انکوباتور (فن آزما گستر، ایران) تحت دما و رطوبت کنترل شده (دمای حدود 12 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد)، قرار گرفتند تا تمامی پوشش‌ها خشک شوند (1). سپس نمونه‌های پنیر پوشش‌دهی شده درون ظروف پلاستیکی در بسته از جنس پلی پروپیلن، بسته بندی شده و طی فواصل زمانی صفر (بلافاصله پس از پوشش‌دهی)، 30، 60 و 75 روز نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آزمون‌های فیزیکوشیمیایی: اندازه گیری pH و اسیدیته مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 2852 و اندازه گیری رطوبت نیز طبق استاندارد ملی ایران به شماره 1753 و روش وزن‌سنجی انجام شد (31).

مقدار افت وزن با توزین نمونه پنیر به کمک ترازوی دیجیتال (Ohaus، سوئیس) با دقت $\pm 0/001$ گرم و رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\Delta W = (I_{w0} - F_{wi}) / I_{w0} \quad (1)$$

در رابطه فوق، ΔW ، I_{w0} و F_{wi} به ترتیب معادل افت وزن، وزن اولیه (روز صفر) و وزن ثانویه پس از گذشت مدت زمان i (30، 60 و 75 روز) می‌باشند (1).

آماده سازی ژل آلوتنه ورا: در ابتدا برگ های تازه آلوتنه ورا را با آب مقطر استریل شستشو داده و سپس، بافت گوشتی که به صورت ژل در بین اپیدرم بالایی و پایینی برگ وجود دارد، به طور دستی جداسازی گردید. ژل‌ها پس از جداسازی توسط مخلوط کن (Hamilton، امریکا) به خوبی خرد شده و با عبور از صافی پارچه ای، ژل خالص و شفاف آلوتنه ورا جمع آوری گردید که در نهایت در دمای 75 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه پاستوریزه شد (28، 11). به دلیل گرانبوی بالای ژل آلوتنه ورا استخراج شده، با افزودن آب مقطر استریل، محلول 50 درصد (w/w) از آن تهیه و در ترکیب پوشش مورد استفاده قرار گرفت.

آماده سازی صمغ فارسی: صمغ‌ها پس از جداسازی مواد زاید، به وسیله آسیاب (Feller، آلمان) پودر شده و پس از عبور از سری الک آزمایشگاهی (دماوند، ایران)، ذرات کوچک‌تر از 250 میکرون (60-)، جداسازی و جمع آوری شدند. برای تهیه ترکیب پوشش، محلول صمغ فارسی با غلظت 3 درصد (w/v) در آب مقطر تهیه و پس از آبیگری کامل صمغ، مورد استفاده قرار گرفت (29، 30).

پوشش‌دهی پنیرها: در این تحقیق از محلول‌های تهیه شده از ژل آلوتنه ورا و صمغ فارسی در مرحله قبل، جهت تهیه نسبت‌های ترکیبی (حجمی) مطابق با جدول زیر، استفاده شد. لازم به توضیح است که حروف A، P و S به ترتیب نشان دهنده ژل آلوتنه ورا، صمغ فارسی و آب نمک هستند و به همان ترتیب، اعداد کنار حروف نیز بیانگر نسبت حجمی مورد استفاده می‌باشند. کدهای S0 و S100 به ترتیب نشان‌دهنده پنیر بدون پوشش و بدون آب نمک و دیگری پنیر بدون پوشش و نگهداری شده درون آب نمک 10% (مشابه نمونه‌های پنیر سفید تجاری) هستند.

جدول 1. معرفی ترکیب اجزای مورد استفاده جهت پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی

کد نمونه پنیر	نسبت حجمی ژل آلوتنه ورا (محلول 50% w/w)	نسبت حجمی صمغ فارسی (محلول 3% w/v)	نگهداری در آب نمک
A100	100	0	-
A75P25	75	25	-
A50P50	50	50	-
A25P75	25	75	-
P100	0	100	-
S0	0	0	-
S100	0	0	+

کلرید سدیم) هستند (31). لازم به توضیح است که تمامی مواد شیمیایی از شرکت Merck آلمان تهیه شدند.

جهت اندازه‌گیری رنگ مواد غذایی از استاندارد CIELab یا $L^* a^* b^*$ استفاده شد. L^* مؤلفه روشنایی یا شفافیت می‌باشد که محدوده آن از 0 تا 100 بوده و a^* (مؤلفه قرمزی تا سبزی) و b^* (مؤلفه زردی تا آبی) دو مؤلفه نامحدود هستند که اغلب، بازه +120 الی -120 برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق از دستگاه رنگ سنج (Minolta Chroma، ژاپن) جهت قرائت فاکتورهای مذکور در روزهای 0، 30، 60 و 75 استفاده شد. اختلاف رنگ کل (Total color difference) یا ΔE نیز از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\Delta E = [(L^* - L_0)^2 + (a^* - a_0)^2 + (b^* - b_0)^2]^{1/2} \quad (3)$$


L_0 ، a_0 و b_0 مقدار شاخص‌های رنگی اولیه نمونه‌های پنیر پوشش‌دهی شده در روز صفر بوده و L^* ، a^* و b^* نیز مقادیر اندازه‌گیری شده در طول دوره نگهداری هستند (32، 1).

ارزیابی حسی: ارزیابی حسی نمونه‌های پنیر با استفاده از روش هدونیک پنج نقطه‌ای و به کمک 15 ارزیاب نیمه آموزش دیده (7 نفر مرد و 8 نفر زن در محدوده سنی حدود 30 سال) در روزهای صفر و 75 انجام شد. ارزیاب‌ها نمونه‌های کدگذاری شده پنیر را از نظر شوری، بافت، بو، رنگ، مزه و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار دادند (33، 1).

تجزیه و تحلیل آماری: این تحقیق بر مبنای طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی انجام و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجزیه واریانس یکطرفه (one way ANOVA) با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. برای مقایسه میانگین اثرات معنی‌دار شده تیمارها نیز از آزمون چند دامنه‌ای دانکن و برای گروه‌های وابسته دوتایی از آزمون تی غیر وابسته استفاده گردید. لازم به توضیح است که جهت ایجاد تکرارپذیری مناسب و حذف داده‌های خطای احتمالی، کلیه آزمون‌ها حداقل سه بار تکرار شدند.

• یافته‌ها

ویژگی‌های فیزیکیوشیمیایی: شیر مورد استفاده در این تحقیق جهت تهیه پنیر، از نوع پاستوریزه و کم‌چرب ($1/500 \pm 0/082$ % چربی) و با $6/600 \pm 0/082$ pH، اسیدیته $0/140 \pm 0/008$ (g برحسب اسید لاکتیک) و حاوی $3/010 \pm 0/014$ % پروتئین و $8/120 \pm 0/008$ % ماده خشک بدون چربی بود که از یک برند معتبر داخلی خریداری شده بود.



شکل 2. نمودار جریان پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی


برای محاسبه نمک موجود در نمونه‌های پنیر در ابتدا 2 گرم از نمونه پنیر کاملاً خرد شده و سپس 25 میلی لیتر نیترات نقره و 25 میلی لیتر اسید نیتریک به آن اضافه گردید. این مخلوط تا نقطه جوش حرارت داده شد و سپس 10 میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم اشباع به محلول در حال جوش اضافه شد تا زمانی که مخلوط بی رنگ شود. در ادامه 100 میلی لیتر آب مقطر و 2 میلی لیتر از محلول اشباع سولفات آمونیوم آهن به آن اضافه و بلافاصله مقدار اضافی نیترات نقره با محلول تیوسیانات آمونیوم تیترا گردید تا محلول به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در آمده و این رنگ به مدت 30 ثانیه پایدار باشد. در نهایت مقدار نمک موجود در نمونه با استفاده از رابطه زیر محاسبه و برحسب درصد بیان گردید:

$$\text{NaCl} = \frac{v_1 - v_2 \times f \times t}{m} \quad (2)$$

در این رابطه v_1 و v_2 به ترتیب حجم محلول تیوسیانات مصرف شده برای شاهد و نمونه مورد آزمون و f و t نیز به ترتیب بیانگر نرمالیتته محلول تیوسیانات آمونیوم، وزن نمونه (گرم) و ضریب $5/85$ (فاکتور بیان نتایج بر حسب درصد

محیط آبی پیرامون پنیر باشد که طی آن میزان اسید در واحد جرم پنیر، کاهش یافته است. تیمارهای مختلف از نظر رطوبت اختلاف آماری معنی‌داری را نشان دادند ($P < 0/05$) به طوری که تقریباً در تمامی روزها، نمونه شاهد بدون پوشش و بدون آب نمک (S0) و نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد صمغ فارسی (P100)، کمترین مقدار رطوبت و نمونه شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) بیشترین مقدار رطوبت را نشان دادند که علت آن نیز به سبب جذب مقداری از آب توسط نمونه پنیر S100 است که موجب افزایش رطوبت در آن شده است. تقریباً تمامی پنیرهای پوشش‌دهی شده رطوبت بالاتری را از S0 نشان دادند که نشانگر اثر مثبت پوشش‌دهی بر حفظ رطوبت پنیر طی نگهداری است.

بررسی تغییرات میزان pH در نمونه‌های پنیر نشان داد که در پی افزایش صمغ فارسی و کاهش مقدار آلونته ورا، میزان pH نمونه‌ها کاهش می‌یابد (نمودار 3-الف) که علت آن احتمالاً به سبب pH پایین صمغ فارسی است که برابر با حدود 4/4 گزارش شده است (30). از نظر اسیدیته نیز اثر متقابل متغیرهای پوشش‌دهی (ژل آلونته ورا و صمغ فارسی) در نمونه‌های پنیر از نظر آماری معنی‌دار بود ($P < 0/05$)؛ ولی این تأثیر پیچیده بوده و نمی‌توان روند خاصی را برای آن پیشنهاد نمود ولی آنچه که قابل ذکر است، آن است که مطابق با نمودار 3-ب، نمونه شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) دارای کمترین مقدار اسیدیته بوده که علت احتمالی آن می‌تواند به سبب امکان خروج مقداری از اسید لاکتیک به



شکل 3. نمودار تغییرات (الف) pH، (ب) اسیدیته، (پ) رطوبت، (ت) افت وزن، (ث) میزان نمک در نمونه‌های پنیر سفید ایرانی پوشش‌دهی شده با 100% ژل آلونته ورا (A100) (O)، 75% ژل آلونته ورا و 25% صمغ فارسی (A75 P25) (■)، 50% ژل آلونته ورا و 50% صمغ فارسی (A50 P50) (▲)، 25% ژل آلونته ورا و 75% صمغ فارسی (A25 P75) (□)، 100% صمغ فارسی (P100) (△) طی 75 روز نگهداری در 4 °C و (●) به ترتیب نشان دهنده نمونه‌های شاهد بدون پوشش و بدون آب نمک (S0) و بدون پوشش و درون آب نمک (S100) هستند.

ΔE را در نمونه‌ها کاهش دهد که این مسأله در مقایسه با نمونه‌های شاهد (S0 و S100) که بالاترین میزان ΔE را طی تمامی روزها نشان می‌دهند، به خوبی اثبات می‌شود به عبارت دیگر، پوشش‌دهی از بروز تغییرات رنگی شدید در پنیرها جلوگیری نموده است. در خصوص ترکیب پوشش نیز نمی‌توان نمونه خاصی را انتخاب نمود اگرچه در روز 75، نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلونه ورا (A100) کمترین میزان ΔE را نشان می‌دهد ($6/912 \pm 0/981$). با گذشت زمان، مقدار ΔE در تمامی نمونه‌ها افزایش یافت که در مورد نمونه شاهد (S0 و S100) بسیار قابل توجه است.

ویژگی‌های حسی: مطابق با جدول 3، اثر پوشش‌دهی و ترکیب آن روی میزان شوری نمونه‌های پنیر معنی‌دار بوده است ($P < 0/05$)، به نحوی که پنیرهای پوشش‌دهی شده نسبت به نمونه‌های شاهد (S0 و S100) مطلوبیت بیشتری را از لحاظ ویژگی حسی شوری نزد ارزیابان داشته‌اند و نمونه‌های پنیر پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلونه ورا (A100) و هم چنین نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد صمغ فارسی (P100) امتیاز بیشتری را پس از گذشت 75 روز کسب نموده‌اند. قابل توجه است که میزان امتیاز شوری برای هر دو نمونه شاهد در این تحقیق (S0 و S100) پس از گذشت 75 روز از تهیه پنیرها، کاهش یافته است که برای S100 اختلاف معنا داری را با روز صفر نشان می‌دهد که به سبب نفوذ نمک در طول زمان و شور شدن نسبی پنیر است. در تمامی نمونه‌ها پس از گذشت 75 روز، امتیاز بافت کاهش یافت، ولی این کاهش در مورد نمونه‌های شاهد بدون پوشش (S0 و S100) چشمگیرتر بود؛ به نحوی که پنیر شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) در روز صفر بالاترین امتیاز بافت را کسب نمود ($4/267 \pm 0/929$) ولی در روز 75، امتیاز آن بسیار کاهش یافت ($2/533 \pm 0/800$).

مطابق با نتایج این تحقیق، پوشش‌دهی توانست در قیاس با نمونه شاهد بدون پوشش و بدون آب نمک (S0)، ویژگی حسی بو را در نمونه‌های پنیر ارتقاء بخشد به نحوی که تمامی نمونه‌های پوشش‌دهی شده طی روزهای 0 و 75، امتیاز بالاتری را از نمونه S0 و حتی در مواردی نمونه S100 کسب نموده‌اند. ارزیابان حسی، رنگ نمونه‌های پوشش‌دهی شده پنیر را مطلوب تشخیص دادند به طوری که پس از گذشت 75 روز نیز تفاوت معنی‌داری از دیدگاه آنان حاصل نشد (جدول 3). مقایسه امتیازهای کسب شده مربوط به ویژگی رنگ برای دو نمونه شاهد S100 و S0 نشان داد که علیرغم کسب امتیاز نسبتاً خوب در روز صفر، ولی پس از گذشت 75 روز، امتیاز هر دو نمونه کاهش معنی‌داری یافت ($P < 0/05$).

با رجوع به نمودار 3- ت مشخص است که به استثنای نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد صمغ فارسی (P100)، میزان افت وزن در سایر نمونه‌ها بسیار کم و قابل قبول است. در خصوص این نمونه باید بیان داشت که علت اصلی افت وزن در آن ($5/723 \pm 0/026$ %) کاهش چشمگیری است که در مقدار رطوبت آن طی 75 روز نگهداری رخ داده است؛ این مسئله احتمالاً مرتبط با ماهیت فیلم تشکیل شده توسط صمغ فارسی است که توانایی نگهداری و جذب آب را نداشته و چه بسا به خروج آب (رطوبت) از بافت پنیر کمک نموده است، بنابراین استفاده از صمغ فارسی به تنهایی جهت پوشش‌دار کردن توصیه نمی‌شود.

از لحاظ میزان نمک، تیمارهای مختلف پوشش‌دهی طی مدت زمان نگهداری اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر نشان دادند ($P < 0/05$) که بیشترین میزان نمک مربوط به نمونه شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) و کمترین مقدار آن، مربوط به نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد صمغ فارسی (P100) و پس از آن، نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلونه ورا (A100) بوده است (نمودار 3- ث).

مطابق با نتایج این تحقیق (جدول 2)، پوشش‌دهی و ترکیب آن می‌تواند به طور معنی‌داری بر روی L^* اثر گذار باشد ($P < 0/05$) و به تدریج که از مقدار ژل آلونه ورا در ترکیب پوشش کاسته و به مقدار صمغ فارسی افزوده می‌گردد، از مقدار L^* نیز کاسته می‌شود، که علت آن مات بودن محلول صمغ فارسی در قیاس با محلول شفاف ژل آلونه ورا است که طبیعتاً بر روی L^* پنیر پوشش داده شده نیز موثر است. با مراجعه به جدول 2 کاملاً مشخص است که میزان قرمزی (a^*) با گذشت زمان افزایش می‌یابد که احتمالاً به سبب خشک شدن سطحی نمونه‌ها طی نگهداری می‌باشد که بر روی رنگ پنیر تأثیر گذار بوده است. مولفه رنگی b^* + نشان دهنده میزان زردی و b^* - نشان دهنده میزان آبی بودن در مواد غذایی است. اثر مدت زمان نگهداری بر روی مولفه b^* نمونه‌ها معنی‌دار بوده ($P < 0/05$) و در روز 75 نگهداری، مقدار b^* منفی می‌شود که نشان دهنده گرایش رنگ نمونه‌ها از زرد به آبی است که احتمالاً به سبب افزایش بار میکروبی در نمونه‌های پنیر طی نگهداری است.

اثر پوشش‌دهی و ترکیب آن و همچنین اثر مدت زمان نگهداری، هر دو در سطح اطمینان 95% روی اختلاف رنگ کل (ΔE) نمونه‌ها بسیار معنی‌دار است ($P < 0/05$) (جدول 2). لازم به توضیح است که از آن جایی که مقدار شاخص‌های رنگی L_0 ، a_0 و b_0 نتایجی هستند که از اندازه‌گیری رنگ نمونه‌ها در روز صفر به دست می‌آیند، لذا مقدار ΔE در روز صفر برابر با صفر شده است. پوشش‌دهی توانسته است مقدار

جدول 2. نتایج ارزیابی شاخص‌های رنگی (انحراف معیار \pm میانگین) نمونه‌های پنیر سفید ایرانی پوشش‌دهی شده طی دوره نگهداری در 4°C

S100	S0	P100	A25 P75	A50 P50	A75 P25	A100	زمان (روز)	شاخص‌های رنگی
81/946 \pm 1/041 ^{b, A}	74/094 \pm 2/701 ^{a, A}	88/070 \pm 1/514 ^{c, A}	91/239 \pm 0/577 ^{d, A}	91/636 \pm 0/951 ^{d, A}	90/263 \pm 0/791 ^{cd, B}	93/305 \pm 0/797 ^{d, B}	0	L*
88/220 \pm 0/236 ^{b, B}	81/617 \pm 0/378 ^{a, B}	91/747 \pm 0/450 ^{de, B}	91/337 \pm 0/333 ^{d, A}	91/353 \pm 0/491 ^{d, A}	89/267 \pm 0/637 ^{c, B}	92/541 \pm 0/473 ^{e, B}	30	
90/696 \pm 0/301 ^{b, C}	90/528 \pm 0/356 ^{b, C}	93/293 \pm 0/829 ^{c, BC}	92/539 \pm 0/069 ^{c, B}	92/474 \pm 0/371 ^{c, A}	86/085 \pm 1/372 ^{a, A}	89/776 \pm 0/442 ^{b, A}	60	
92/867 \pm 0/793 ^{cd, D}	94/933 \pm 1/408 ^{c, D}	94/200 \pm 0/860 ^{de, C}	93/677 \pm 0/028 ^{cde, C}	92/033 \pm 0/858 ^{c, A}	84/530 \pm 0/417 ^{a, A}	88/400 \pm 1/105 ^{b, A}	75	
81/946 \pm 1/041 ^{b, A}	74/094 \pm 2/701 ^{a, A}	88/070 \pm 1/514 ^{c, A}	91/239 \pm 0/577 ^{d, A}	91/636 \pm 0/951 ^{d, A}	90/263 \pm 0/791 ^{cd, B}	93/305 \pm 0/797 ^{d, B}	0	a*
88/220 \pm 0/236 ^{b, B}	81/617 \pm 0/378 ^{a, B}	91/747 \pm 0/450 ^{de, B}	91/337 \pm 0/333 ^{d, A}	91/353 \pm 0/491 ^{d, A}	89/267 \pm 0/637 ^{c, B}	92/541 \pm 0/473 ^{e, B}	30	
90/696 \pm 0/301 ^{b, C}	90/528 \pm 0/356 ^{b, C}	93/293 \pm 0/829 ^{c, BC}	92/539 \pm 0/069 ^{c, B}	92/474 \pm 0/371 ^{c, A}	86/085 \pm 1/372 ^{a, A}	89/776 \pm 0/442 ^{b, A}	60	
92/867 \pm 0/793 ^{cd, D}	94/933 \pm 1/408 ^{c, D}	94/200 \pm 0/860 ^{de, C}	93/677 \pm 0/028 ^{cde, C}	92/033 \pm 0/858 ^{c, A}	84/530 \pm 0/417 ^{a, A}	88/400 \pm 1/105 ^{b, A}	75	
5/658 \pm 1/291 ^{ab, C}	4/269 \pm 0/502 ^{ab, C}	5/233 \pm 1/277 ^{ab, C}	5/894 \pm 0/711 ^{b, D}	5/719 \pm 0/660 ^{ab, D}	5/361 \pm 0/940 ^{ab, D}	3/804 \pm 0/709 ^{a, D}	0	b*
2/166 \pm 0/062 ^{b, B}	2/007 \pm 0/017 ^{a, B}	3/014 \pm 0/105 ^{c, B}	3/149 \pm 0/072 ^{d, C}	4/751 \pm 0/033 ^{e, C}	4/717 \pm 0/076 ^{e, C}	2/107 \pm 0/006 ^{ab, C}	30	
1/129 \pm 0/100 ^{a, B}	1/713 \pm 0/163 ^{c, B}	1/778 \pm 0/100 ^{c, B}	2/036 \pm 0/054 ^{d, B}	1/515 \pm 0/004 ^{b, B}	2/641 \pm 0/022 ^{e, B}	1/119 \pm 0/080 ^{a, B}	60	
-2/433 \pm 0/368 ^{a, A}	-1/300 \pm 0/648 ^{bc, A}	-0/700 \pm 0/572 ^{c, A}	-1/933 \pm 0/125 ^{ab, A}	-1/867 \pm 0/450 ^{ab, A}	-2/088 \pm 0/045 ^{ab, A}	-0/733 \pm 0/340 ^{c, A}	75	
0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0 \pm 0/000 ^{a, A}	0	ΔE
7/406 \pm 0/233 ^{e, B}	7/880 \pm 0/360 ^{e, B}	4/377 \pm 0/395 ^{d, B}	2/976 \pm 0/099 ^{c, B}	1/420 \pm 0/047 ^{ab, B}	1/318 \pm 0/545 ^{a, B}	2/018 \pm 0/113 ^{b, B}	30	
10/229 \pm 0/263 ^{c, C}	16/811 \pm 0/334 ^{d, C}	6/430 \pm 0/641 ^{b, C}	4/837 \pm 0/063 ^{a, C}	4/872 \pm 0/044 ^{a, C}	5/007 \pm 0/595 ^{a, C}	4/584 \pm 0/287 ^{a, C}	60	
14/172 \pm 0/858 ^{c, D}	21/876 \pm 0/295 ^{d, D}	8/781 \pm 0/795 ^{b, D}	8/733 \pm 0/523 ^{b, D}	8/165 \pm 0/085 ^{ab, D}	9/501 \pm 0/26 ^{b, D}	6/912 \pm 0/981 ^{a, D}	75	

حروف کوچک متفاوت در هر سطر به طور جداگانه، بیانگر معنی‌دار بودن اثر پوشش‌دهی و ترکیب آن است ($P < 0/05$).
حروف بزرگ متفاوت طی روزهای نگهداری (0, 30, 60 و 75) در هر ستون به طور جداگانه، بیانگر معنی‌دار بودن اثر مدت زمان نگهداری (4°C) است ($P < 0/05$).

البته با کاهش محتوای آن و افزایش صمغ فارسی، امتیاز مزه روند کاهشی را نشان داد. از سوی دیگر، طی تمامی روزهای مورد بررسی، نمونه‌های شاهد یعنی S0 و S100 کمترین امتیاز پذیرش کلی را کسب نمودند، لذا قابل توجه است که پوشش‌دهی توانسته است اثر مطلوبی روی پذیرش کلی نمونه‌های پنیر از دیدگاه ارزیابان حسی باقی بگذارد به نحوی که پنیر پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلوئه ورا (A100) همواره بالاترین امتیاز را کسب نموده است.

مطابق با جدول 3، در روز صفر بالاترین امتیاز مزه به پنیر پوشش داده شده با 100 درصد ژل آلوئه ورا (A100) تعلق یافت در حالی که کمترین امتیاز متعلق به نمونه شاهد بدون پوشش و بدون آب نمک (S0) بود که البته علت آن، افزایش اسیدیته، فعالیت میکروارگانیسم‌ها و خشک شدن سطحی آن است. قابل توجه است که این رویه پس از گذشت 75 روز از تولید نیز همچنان مشاهده گردید که نشان دهنده مطلوبیت مزه در پنیرهای پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا است که

جدول 3. نتایج ارزیابی ویژگی‌های حسی (انحراف معیار \pm میانگین) نمونه‌های پنیر سفید ایرانی پوشش‌دهی شده طی دوره نگهداری در 4°C

S100	S0	P100	A25 P75	A50 P50	A75 P25	A100	زمان (روز)	ویژگی حسی
3/200 \pm 0/833 ^{abc, B}	2/933 \pm 0/854 ^{a, A}	2/867 \pm 0/618 ^{a, A}	3/533 \pm 0/499 ^{bc, A}	3/667 \pm 0/471 ^{c, A}	3/067 \pm 0/573 ^{ab, A}	3/333 \pm 0/471 ^{abc, A}	0	شوری
2/333 \pm 0/943 ^{a, A}	2/867 \pm 0/806 ^{b, A}	3/333 \pm 0/596 ^{bc, B}	3/267 \pm 0/442 ^{bc, A}	3/267 \pm 0/442 ^{bc, A}	3/133 \pm 0/340 ^{bc, A}	3/600 \pm 0/611 ^{c, A}	75	
4/267 \pm 0/929 ^{b, B}	3/800 \pm 0/653 ^{ab, B}	3/800 \pm 0/789 ^{ab, A}	3/800 \pm 0/542 ^{ab, A}	3/867 \pm 0/499 ^{ab, B}	3/600 \pm 0/800 ^{a, A}	3/800 \pm 0/833 ^{ab, A}	0	بافت
2/533 \pm 0/800 ^{a, A}	2/400 \pm 0/611 ^{a, A}	3/200 \pm 0/542 ^{b, A}	3/400 \pm 0/490 ^{b, A}	3/400 \pm 0/490 ^{b, A}	3/333 \pm 0/471 ^{b, A}	3/400 \pm 0/490 ^{b, A}	75	
4/133 \pm 0/956 ^{b, B}	3/267 \pm 0/400 ^{a, B}	3/533 \pm 0/718 ^{a, A}	4/333 \pm 0/471 ^{bc, B}	4/333 \pm 0/596 ^{bc, B}	4/133 \pm 0/618 ^{b, B}	4/800 \pm 0/400 ^{c, B}	0	بو
3/067 \pm 0/997 ^{b, A}	2/000 \pm 0/632 ^{a, A}	3/200 \pm 0/541 ^{b, A}	3/333 \pm 0/699 ^{b, A}	3/067 \pm 0/679 ^{b, A}	3/200 \pm 0/748 ^{b, A}	3/200 \pm 0/748 ^{b, A}	75	
4/200 \pm 0/086 ^{ab, B}	4/133 \pm 0/996 ^{ab, B}	3/667 \pm 0/772 ^{a, A}	4/200 \pm 0/980 ^{ab, A}	4/333 \pm 0/669 ^{ab, A}	4/467 \pm 0/618 ^{b, A}	4/800 \pm 0/400 ^{b, A}	0	رنگ
3/400 \pm 0/699 ^{b, A}	2/400 \pm 0/789 ^{a, A}	3/267 \pm 0/854 ^{b, A}	4/267 \pm 0/929 ^{c, A}	4/267 \pm 0/772 ^{c, A}	4/667 \pm 0/471 ^{c, A}	4/733 \pm 0/442 ^{c, A}	75	
3/467 \pm 0/884 ^{ab, B}	2/933 \pm 0/854 ^{a, B}	3/067 \pm 0/997 ^{a, B}	3/333 \pm 0/942 ^{ab, A}	3/467 \pm 0/805 ^{ab, A}	3/400 \pm 0/490 ^{ab, A}	4/133 \pm 0/498 ^{b, B}	0	مزه
2/667 \pm 0/854 ^{bc, A}	1/933 \pm 0/853 ^{a, A}	2/533 \pm 0/805 ^{ab, A}	3/000 \pm 0/966 ^{bcd, A}	3/000 \pm 0/730 ^{bcd, A}	3/267 \pm 0/771 ^{cd, A}	3/467 \pm 0/618 ^{d, A}	75	
3/533 \pm 0/618 ^{abc, B}	3/133 \pm 0/339 ^{a, B}	3/200 \pm 0/653 ^{ab, A}	3/667 \pm 0/596 ^{ab, B}	3/733 \pm 0/573 ^{c, A}	3/533 \pm 0/884 ^{abc, A}	3/800 \pm 0/400 ^{c, A}	0	پذیرش کلی
2/866 \pm 0/956 ^{b, A}	2/267 \pm 0/679 ^{a, A}	3/067 \pm 0/573 ^{bc, A}	3/266 \pm 0/442 ^{bc, A}	3/400 \pm 0/611 ^{bc, A}	3/267 \pm 0/442 ^{bc, A}	3/667 \pm 0/869 ^{c, A}	75	

حروف کوچک متفاوت در هر سطر به طور جداگانه، بیانگر معنی‌دار بودن اثر پوشش‌دهی و ترکیب آن است ($P < 0/05$).
حروف بزرگ متفاوت طی روزهای نگهداری (0 و 75) در هر ستون به طور جداگانه، بیانگر معنی‌دار بودن اثر مدت زمان نگهداری (4°C) است ($P < 0/05$).

• بحث

پنیر محلی (Regional) پوشش‌دهی شده با گالاکتومانان - کیتوزان طی 21 روز نگهداری، حدود 23/6 درصد کاهش یافت (37). Martins و همکاران نیز رطوبت پنیر ریکوتا پوشش‌دهی شده با گالاکتومانان (40/70%) را بیشتر از پنیر شاهد بدون پوشش (37/63%) گزارش نمودند (19). در مورد افت وزن، کمترین مقدار آن، در نمونه شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) مشاهده گردید که دلیل آن، حضور آب و جلوگیری از خروج رطوبت از بافت پنیر و ممانعت از خشک شدن سطحی آن است. Kampf و Nussinovitch طی تحقیقی گزارش دادند که افت وزن در پنیرهای نیمه سختی که با ترکیبات آلژینات، ژلان و کاراگینان پوشش‌دهی شده بودند در مقایسه با پنیر بدون پوشش، کاهش وزن کمتری را داشته‌اند (16). Fajardo و همکاران نیز نشان دادند که پنیر سالویو پوشش‌دهی شده با کیتوزان و کیتوزان - ناتاماسین، به ترتیب حدود 7 و 6/8% افت وزن را در مدت نگهداری 37 روزه از خود نشان داد (18) که در قیاس با دوره 75 روزه نگهداری پنیرها در این تحقیق و افت وزن بسیار کمتری که مشاهده شد، لذا می‌توان اظهار داشت که پوشش‌های انتخاب شده (به غیر از P100) به خوبی توانسته‌اند از افت وزن طی مدت زمان نگهداری جلوگیری نمایند.

از آن جایی که یکی از اهداف این تحقیق، بررسی کاربرد پوشش‌دهی به عنوان جایگزینی برای نگهداری در آب نمک برای پنیر سفید ایرانی و در نتیجه، کاهش میزان جذب نمک به داخل لخته توسط بافت پنیر بوده است، لذا با قیاس مابین نمونه‌های پوشش‌دهی شده با دو نمونه شاهد (S0 و S100)، مشاهده می‌شود که پوشش‌دهی توانسته است کمک شایان توجهی به این هدف بنماید و تمامی نمونه‌های پوشش‌دهی شده میزان نمک کمتری را دارا هستند که با نتایج سایر محققانی که به بررسی تاثیر پوشش‌دهی روی ویژگی‌های پنیر پرداخته بودند، همخوانی دارد (35، 1). از سوی دیگر، طی 75 روز نگهداری پنیرها، میزان نمک در آن‌ها با شیب ملایمی افزایش یافت که البته علت آن، افت وزن ناشی از خروج رطوبت از بافت پنیر است که منجر به افزایش مقدار نمک در واحد جرم شده است.

احتمالاً تغییرات ایجاد شده در رنگ پنیرها به دلیل اکسیداسیون سطحی پنیرها می‌باشد که در پنیرهای پوشش‌دهی شده به علت محافظت در برابر اکسیژن (نفوذ پذیری کمتر اکسیژن) و نور (کدر بودن پوشش) کمتر بوده است. همچنین تغییر رنگ ممکن است مربوط به سرعت از دست دادن آب توسط پنیر نیز باشد که در پنیرهای پوشش

برابر با نتایج به دست آمده، pH تمامی نمونه‌های پنیر روند کاهشی چشمگیری را تا 75 روز طی نمودند که علت آن ممکن است در نتیجه فعالیت باکتری‌های اسید لاکتیک گونه لاکتوباسیلوس باشد که لاکتوز را به لاکتات متابولیزه کرده و بدینوسیله منتهی به تولید اسید می‌گردند (34) که این نتایج با نتایج تحقیق Ramos و همکاران که میزان pH پنیر پوشش‌دهی شده با ایزوله پروتئین آب پنیر، صمغ گوار و ترکیبات ضد میکروبی را طی 60 روز نگهداری ارزیابی نمودند، مطابقت دارد (1). Dagdemir و Yilmaz نیز که از پوشش موم زنبور عسل با دو ضخامت مختلف (یک لایه ای و دو لایه‌ای)، در پنیر کاشار (Kashar) استفاده نمودند، گزارش دادند که میزان pH پنیرهای پوشش داده شده با موم زنبور عسل طی 90 روز نگهداری کاهش یافت (35). از سوی دیگر، با گذشت مدت زمان نگهداری، اسیدیته تیمارهای مختلف، روند افزایشی از خود نشان می‌دهند که احتمالاً افزایش تولید اسید لاکتیک بوسیله باکتری‌ها، می‌تواند دلیل اصلی این روند باشد که البته با روند کاهشی که در مقدار pH طی مدت زمان نگهداری مشاهده شد، مطابقت دارد. این نتایج با نتایج DiPierro و همکاران که گزارش نمودند میزان اسیدیته پنیر ریکوتا (Ricotta) پوشش داده شده با فیلم خوراکی کیتوزان - پروتئین آب پنیر در مدت 21 روزه نگهداری، از 0/26 به 0/31 درصد افزایش یافت، مطابقت دارد (20). Yilmaz و Dagdemir نیز مشاهده نمودند که طی 120 روز نگهداری مقدار اسیدیته پنیرهای پوشش داده شده با موم زنبور عسل از 0/45 به 0/81 درصد افزایش یافت (35).

نتایج بخش رطوبت در این تحقیق اثبات نمود که پوشش ترکیبی پنیرها (آلونه ورا - صمغ فارسی) اثر موثرتری در حفظ رطوبت نسبت به پوشش تکی آن‌ها داشته است، به طوری که در نمونه پوشش‌دهی شده با 100 درصد صمغ فارسی (P100) مقدار رطوبت طی نگهداری به شدت افت پیدا کرده و پس از 75 روز به کمترین مقدار (56/67 ± 0/008%) می‌رسد که البته نشان دهنده مناسب نبودن صمغ فارسی به تنهایی در پوشش‌دهی پنیر و حفظ رطوبت است. با گذشت 75 روز از تهیه پنیرها، به تدریج رطوبت افت پیدا می‌کند که علت آن خروج مقداری از رطوبت از بافت پنیر و لفاف بسته بندی به محیط خارج است و تفاوت مابین نمونه‌های پوشش‌دهی شده نیز، احتمالاً به دلیل ترکیب پوشش و همچنین سنتیک نفوذ و خروج آب به درون پوشش‌های مختلف است (36). Cerqueira و همکاران طی تحقیقی گزارش دادند که میزان رطوبت نوعی

نگهداری نمونه‌های پنیر، مطلوبیت مزه در پنیرهای پوشش داده شده با ژل آلوتی ورا ثابت باقی ماند و ارزیابان حسی، مزه پنیرهای پوشش‌دهی شده با مقادیر بالای ژل آلوتی ورا را طی روزهای مختلف، بهتر از نمونه شاهد بدون پوشش و درون آب نمک (S100) تشخیص دادند؛ به نحوی که پنیر پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلوتی ورا (A100) همواره بالاترین امتیاز پذیرش کلی را کسب نمود. محققان طی پژوهشی نشان دادند که بیشترین امتیاز پذیرش کلی طی 120 روز نگهداری، مربوط به نمونه‌های پنیر کاشار پوشش داده شده با موم زنبور عسل در قیاس با نمونه‌های بدون پوشش و یا نمونه‌های بسته بندی شده تحت خلأ بوده است (35).

به طور کلی، بررسی اثرات پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی با ترکیب ژل آلوتی ورا و صمغ فارسی به عنوان جایگزینی جهت نگهداری در آب نمک در مقایسه با نمونه‌های شاهد، نشان داد که پنیر پوشش‌دهی شده با فیلم خوراکی ترکیبی ژل آلوتی ورا - صمغ فارسی، ویژگی‌های فیزیکیوشیمیایی و حسی مطلوبی را دارا نبوده ولی استفاده از ژل آلوتی ورا به تنهایی به عنوان پوششی مناسب جهت نگهداری پنیر سفید ایرانی توصیه می‌شود که علت آن، عدم ایجاد تغییرات قابل توجه در ویژگی‌های فیزیکیوشیمیایی پنیر نظیر pH، اسیدیته، رطوبت، افت وزن، رنگ و هم چنین، کسب امتیازات برتر و یا مشابه نسبت به نمونه‌های شاهد طی ارزیابی حسی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت بهبود اثر فرآیند پوشش‌دهی با ژل آلوتی ورا، اثر ترکیب ژل آلوتی ورا همراه با مواد ضد میکروبی جهت پوشش‌دهی پنیر سفید ایرانی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

دار کمتر بوده و سطح پنیر کمتر خشک شده و تیرگی کمتری نیز دارد (1). Ramos و همکاران که از پوشش خوراکی حاوی ترکیبات ضد میکروبی برای پوشش‌دهی پنیر، طی 60 روز نگهداری استفاده نمودند، گزارش دادند که پنیرهای بدون پوشش بالاترین میزان اختلاف رنگ (ΔE) را در مقایسه با پنیرهای پوشش دار نشان دادند (1)؛ Martins و همکاران نیز نتایج مشابهی را در مورد پنیر ریکوتا پوشش‌دهی شده گزارش نمودند (19).

در مورد ویژگی‌های حسی، در تمامی نمونه‌ها پس از گذشت 75 روز، امتیاز بافت کاهش یافت، ولی این کاهش در مورد نمونه‌های شاهد بدون پوشش (S0 و S100) چشمگیرتر بود؛ به عبارت دیگر، پوشش‌دهی توانسته است به خوبی موجبات حفظ بافت پنیر را طی 75 روز نگهداری فراهم نماید. Ramos و همکاران (2012) نیز گزارش دادند که پنیرهای پوشش دار بافت سفت تری از پنیرهای بدون پوشش داشتند (1). در مورد ویژگی حسی بو نیز، Ramos و همکاران به نتایج مشابهی در خصوص کاهش امتیاز بو در نمونه‌های بدون پوشش دست یافتند (1). ارزیابان حسی، به نمونه پنیر پوشش‌دهی شده با 100 درصد ژل آلوتی ورا (A100) بالاترین امتیاز را اختصاص دادند که احتمالاً به سبب شفاف بودن فیلم ژل آلوتی ورا است که ظاهر مناسبی را در قیاس با صمغ فارسی که کاملاً مات است، به پنیر داده است. Dagdemir و Yilmaz گزارش نمودند که طی 120 روز نگهداری هیچ تفاوت معنی‌داری در رنگ نمونه‌های پنیر پوشش داده شده با موم زنبور عسل، مشاهده نشد که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد (35). قابل توجه است که حتی پس از گذشت 75 روز از

• References

- Ramos, OL, Pereira, JO, Silva, SI, Fernandes, JC, Franco, MI, Lopes-da-Silva, JA, et al. Evaluation of antimicrobial edible coatings from a whey protein isolate base to improve the shelf life of cheese. *Am Dairy Sci Association* 2012; 95: 6282-6292.
- Fruzan SH, Kjosroshahi Asl A, Taslimi A. Study the effect of three type of rennet on rheological properties and microstructure of Iranian white cheese. *Iranian Food Sci Tech* 2008; 6(3): 63-72 [in Persian].
- Guillermo A, Susana E, Amelia C. Secondary proteolysis of Fynbo cheese salted with NaCl/KCl brine and ripened at various temperatures. *Food Chem* 2006; 96: 297-303.
- Morris HA, Guinee TP, Fox PF. Salt diffusion in Cheddar cheese. *J Dairy Sci* 1985; 68: 1851-1858.
- Katsiari MC, Voutsinas LP, Alichanidis E, Roussis G. Manufacture of Kefalogr aviera cheese with less sodium by replacement of NaCl with KCl. *Food Chem* 1998; 61: 63-70.
- Mutlag MA, Wibey RA. Effect of chymosin reduction and salt substitution on the properties of white salted cheese. *Int Dairy J* 2006; 16: 903-9.
- Cerqueira MA, Bourbon AI, Pinheiro AC, Martins JT, Souza BWS, Teixeira JA, et al. Galactomannans use in the development of edible films/coatings for food applications. *Trends Food Sci Tech* 2011; 22: 662-671.
- Mirnezami Ziabari S. *Food packaging principals*. Aeezh: Tehran; 2009. p. 337 [in Persian].
- Rao, MS, Kanatt, SR, Chawla SP, Sharma A. Chitosan and guar gum composite films: Preparation, physical, mechanical and antimicrobial properties. *Carbohydr Polym* 2010; 82: 1243-1247.

10. Wang Y, Li D, Wang L, Özkan N .Dynamic mechanical properties of flaxseed gum based edible films. *Carbohydr Polym* 2011; 86: 499–504.
11. Mirghafari S, Rahimi S. Evaluation of physicochemical, emulsion and rheological properties of mayonnaise sauce containing soy milk and aloe vera gel. *JIFT* 2016; 3(11): 73-83 [in Persian].
12. Bozzi, A, Perrin, C, Austin, S, Vera, A. Quality and authenticity of commercial *Aloe vera* gel powders. *Food Chem* 2007; 103: 22-30.
13. Choi S, Chung M. A review on the relationship between *Aloe vera* component and their biologic effects. *Seminars in Integrative Medicine* 2003; 1: 53-62.
14. Abbasi, S, Rahimi, S. Persian gum. In: Mishra S, editor. *Encyclopedia of biomedical polymers and polymeric biomaterials*. Taylor & Francis. USA; 2015: 5919-5928.
15. Rahimi S, Abbasi S. Determination of some physicochemical and gelling properties of Persian gum. *JIFT* 2014; 1(4): 13-27 [in Persian].
16. Kampf N, Nussinovitch A. Hydrocolloid coating of cheeses. *Food Hydrocolloid* 2000; 14:531-537.
17. Cerqueira M, Lima A, Souza B, Teixeira J, Moreira R, Vicente O. Functional polysaccharides as edible coatings for cheese. *Journal of Agricultural and Food Chem* 2009; 57: 1456–1462.
18. Fajardo P, Martins JT, Fuciños C, Pastrana L, Teixeira JA, Vicente AA. Evaluation of a chitosan-based edible film as carrier of natamycin to improve the storability of Saloio cheese. *J Food Eng* 2010; 101(4): 349-356.
19. Martins J, Cerqueira M, Souza B, Avides M, Vicente A. Shelf life extension of Ricotta cheese using coatings of Galactomannans from nonconventional sources incorporating Nisin against *Listeria monocytogenes*. *J Agr Food Chem* 2010; 58: 1884-1891.
20. Di Pierro P, Sorrenito A, Mariniello L, Giosafatto CVL., Porta R. Chitosan/ whey protein film as active coating to extend Ricotta cheese shelf-life. *LWT- Food Sci Techol* 2011; 44: 2324-2327.
21. Medeiros B, Cerqueira M, Vicente A, Carneiro- da-Cunha M, Bourbon A, Pinheiro A, et al. Physical characterization of an alginate/lysozyme nano-laminate coating and its evaluation on “Coaiho” cheese shelf life. *Food Bioprocess Tech* 2014; 7: 1088-1098.
22. Mastromatteo M, Conte A, Lucera A, Saccotelli MA, Buonocore GG, Zambrini AV, et al. Packaging solutions to prolong the shelf life of Fiordilatte cheese: Bio-based nanocomposite coating and modified atmosphere packaging. *LWT- Food Sci Techol* 2011; 60: 230-237.
23. Cui HY, Wu J, Li CZ, Lin L. Anti-listeria effects of chitosan-coated nisin-silica liposome on Cheddar cheese. *J Dairy Sci* 2016; 99(11): 8598-8606.
24. Fuciños C, Amado IR, Fuciños P, Fajardo P, Rúa ML, Pastrana LM. Evaluation of antimicrobial effectiveness of pimaricin-loaded thermosensitive nanohydrogel coating on Arzúa-Ulloa DOP cheeses. *Food Control* 2017; 73: 1095-1104.
25. Artiga-Artigas M, Acevedo-Fani A, Martín-Belloso O. Improving the shelf life of low-fat cut cheese using nanoemulsion-based edible coatings containing oregano essential oil and mandarin fiber. *Food Control* 2017; 76: 1-12.
26. Ghanbari Shendi E, Khosroshahi Asl A, Mortazavi A, Tavakulipor H, Ebadi AG, Afshari H. The effect of Arabic gum using on improving of texture and rheological properties of Iranian low fat white cheese. *J Agri Envirom Sci* 2010; 8(5): 607-614.
27. Mashayekhi, MT. Iranian white cheese: introduction to processing and quality factors. *Aeezh: Tehran*; 2013. p. 96 [in Persian].
28. Agarry, OO, Olaleye, MT, Bello, CO. Comparative antimicrobial activities of *Aloe vera* gel and leaf. *Afr J Biotech* 2005; 12(4): 1413-1414.
29. Khalighi S, Abbasi S. Possibility of edible film production from Persian gum. 20th National Conference of Food Science and Technology, Tehran [in Persian].
30. Rahimi S, Abbasi S, Sahari M, Azizi M. Separation and determination of some chemical and functional properties of soluble and insoluble fractions of almond tree exudates gum (Persian gum). *Iranian Food Sci Tech* 2012; 40 (10): 1-10 [in Persian].
31. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, Cheese and Milk- specifications. ISIRI no 1089- 5486-1753-2852-10154. 1999 [in Persian].
32. Yam KL, Papadakis SE. A digital imaging method for measuring and analyzing color of food surfaces. *J Food Eng* 2004; 61: 137-1420.
33. Ghazizadeh M, Razaghi A. Sensory evaluation of foods. *Institute of Nutrition and Food Technologies: Tehran*; 1998 [in Persian].
34. Dermiki M, Ntzimani A, Badeka A, Savvaidis IN, Kontominas MG. Shelf-life extension and quality attributes of the whey cheese. *LWT-Food Sci Techol* 2008; 41(2): 284-294.
35. Yilmaz F, Dagdemir E. The effects of beeswax coating on quality of Kashar cheese during ripening. *Int J Food Sci Tech* 2012; 47: 2582-2589.
36. Pantaleão I, Pintado ME, Poças MF. Evaluation of two packaging systems for regional cheese. *Food Chem* 2007; 102 (2): 481–487.
37. Cerqueira M, Sousa-Gallagher M, Macedo L, Rodriguez-Aguilera R, Souza B, Teixeira J, et al. Use of galactomannan edible coating application and storage temperature for prolonging shelf-life of “Regional” cheese. *J Food Eng* 2010; 97: 87-94.

The Effect of Edible *Aloe vera* Gel-Persian Gum Film on Iranian White Cheese Properties

Jamshidi F¹, Rahimi S^{*2}, Fadaei Noghani V³

1- MSc Graduated, Department of Food Science & Technology, Shahr-e-Qhods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2- *Corresponding author: Assistant Professor, Food Technology, Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran. Email: s.rahimi@irost.ir

3- Department of Food Science & Technology, Shahr-e-Qhods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Received 3 Feb, 2017

Accepted 26 Apr, 2017

Background and Objectives: Nowadays, coating by natural materials is one of the novel food preservation methods with extensive applications. Iranian white cheese is a popular food among Iranians but its high daily intake due to its high salt content (stored in brine), may threaten the health of consumers, including children, elderly, people who suffer from the blood pressure fluctuations, etc.

Materials & Methods: In this study, Iranian white cheese was coated by immersion method with a combination of *Aloe vera* gel (50% w/w) and Persian gum (3% w/v) at different levels of 0, 25, 50, 75% and 100% v/v instead of storage at brine. Two uncoated specimens were considered as the control (in or out of brine), then the physicochemical and sensory properties were investigated for the period of about 75 days (4°C).

Results: The results showed that during storage, pH and moisture decreased significantly while the acidity, weight loss and ΔE increased ($p < 0.05$). The effect of coating and the mixture of coats were significant on the salt content ($p < 0.05$) whereas the samples which were coated by 100% Persian gum and 100% *Aloe vera* gel, had the minimum amount of salt in 75 days. Coating with the various ratios of *Aloe vera* gel and Persian gum mix affected all of the sensory properties of the specimens ($p < 0.05$).

Conclusion: Generally, the cheese samples which were coated by 100% *Aloe vera* gel were considered as the best formulation for coating of Iranian white cheese because of the highest score of total acceptance and low salt content, therefore the healthiest option.

Keywords: Coating, *Aloe vera* gel, Persian gum, Iranian white cheese