

بررسی اثرات افزودن اینولین بر ویژگی‌های کیفی نوشیدنی مالت در حین نگهداری در دماهای مختلف

سعیده اسمعیلی¹، الهام واعظ²، علی یاسینی²، سید امیر محمد مرتضویان³، سارا سهراب‌وندی⁴، روح‌الله فردوسی⁵، کیانوش خسروی دارانی⁶

- 1- کارشناس ارشد گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- 2- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، یزد، ایران
- 3- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- 4- نویسنده مسئول: استادیار گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، پست الکترونیکی: sohrabv@sbmu.ac.ir
- 5- استادیار گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- 6- دانشیار گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 94/8/14

تاریخ پذیرش: 94/12/16

چکیده

سابقه و هدف: نوشیدنی مالت به دلیل ویژگی‌های حسی و تغذیه‌ای یکی از نوشیدنی‌های پرمصرف در دنیا می‌باشد. با غنی‌سازی نوشیدنی‌ها با اجزای فراسودمند مانند پری بیوتیک‌ها به عنوان جایگزین مناسب ساکارز می‌توان در جهت بهبود سلامت جامعه عمل نمود. هدف از این تحقیق، تولید آزمایشگاهی نوشیدنی پری بیوتیک مالت با هدف جایگزینی ساکارز با اینولین و بررسی خواص فیزیوشیمیایی آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ورت حاوی رازک و اینولین به تنهایی یا به همراه ساکارز با نسبت‌های مشخص (اینولین 3٪، اینولین 1/5٪-ساکارز 1/5٪، ساکارز 3٪) تهیه شدند و پس از پاستوریزاسیون در دو دمای 4°C و 25°C در مدت 4 ماه نگهداری شدند و آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی (pH، بریکس، اسیدیته و رنگ) هر 2 ماه یکبار روی نمونه‌ها انجام شد.

یافته‌ها: میزان بریکس نمونه‌ها با درصد اینولین ارتباط مستقیم دارد. تیمارهای حاوی 3٪ اینولین بیشترین و تیمار شاهد کمترین مقدار بریکس را دارا بود. افزودن اینولین و کاهش مقدار ساکارز بر روی pH نمونه‌ها در طول مدت نگهداری تغییر معنی‌داری ایجاد نکرد ($p>0/05$). بدین گونه که ابتدا در زمان‌های اولیه pH در نمونه‌های حاوی اینولین بیشترین مقدار و با گذشت زمان pH کاهش یافت. در تمام نمونه‌ها میزان pH به طور محسوسی تغییر نکرده است ولی در نمونه‌های اینولین 3٪ نسبت به اینولین 1/5 درصد میزان pH کمتر کاهش یافته است. به علاوه، کاهش میزان اینولین منجر به افزایش اسیدیته شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، با افزایش اینولین، مقدار رنگ و کدورت به دلیل کاهش پراکنش نور بیشتر می‌شود. تغییرات رنگ در طول مدت نگهداری در دو دمای 4°C و 25°C معنی‌دار نبود ($p>0/05$).

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد افزودن اینولین به نوشیدنی مالت بدون آن‌که در ویژگی‌های فیزیوشیمیایی آن تغییر معنی‌دار نامطلوبی ایجاد کند، می‌تواند با بهبود ویژگی‌های تغذیه‌ای آن از طریق تولید نوشیدنی پری بیوتیک اثر سلامت بخش بر سلامت جامعه داشته باشد و به عنوان جایگزین مناسب ساکارز استفاده شود.

واژگان کلیدی: نوشیدنی مالت، پری بیوتیک، اینولین

• مقدمه

مالت حاوی اتانل، گاز دی اکسیدکربن، نمک‌های غیرآلی و حدود 800 نوع ترکیب آلی دیگر می‌باشد.

در نوشیدنی مالت افزودنی‌های مختلفی هم به عنوان پری بیوتیک و هم به عنوان جایگزین قند می‌توانند اضافه شوند (7). امروزه گرایش مصرف کنندگان به سمت نوشیدنی‌های

نوشیدنی مالت (ماء‌الشعیر) از جمله نوشیدنی‌های پرمصرف در سراسر دنیا می‌باشد که در مقایسه با سایر نوشیدنی‌ها به دلیل خواص حسی و ویژگی‌های تغذیه‌ای از جمله ویتامین‌های گروه B بسیار مورد توجه است (1-6). ماء‌الشعیر

اینولین از نظر شیمیایی جزء دسته فروکتان‌ها و پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای طبقه‌بندی شده است. در ساختار شیمیایی اینولین مولکول‌های فروکتوز توسط پیوند فروکتوزیل (1-2) β به یکدیگر متصل شده و معمولاً یک مولکول گلوکز به یک انتهای زنجیره فروکتوزی متصل شده و تشکیل یک مولکول ساکارز می‌دهد. با افزایش طول زنجیره‌ی فروکتوزی از قابلیت انحلال و میزان شیرینی این ترکیبات کاسته می‌شود. ترکیبات اینولین بدون هیچ‌گونه تغییری توسط آنزیم‌های موجود در قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش، وارد کولون شده و در آن جا به وسیله آنزیم β فروکتوزیداز یا اینولیناز تولید شده توسط بیفیدوباکترها تخمیر شده که نتیجه این تخمیر تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و افزایش توده باکتریایی رودهاست (23).

نظر به تمامی سودمندی‌های اشاره شده مربوط به پری‌بیوتیک‌ها، هدف از این تحقیق، تولید آزمایشگاهی نوشیدنی پری‌بیوتیک مالت با هدف جایگزینی با ساکارز و بررسی خواص فیزیکی شیمیایی آن است.

• مواد و روش‌ها

ورت از شرکت بهنوش خریداری شد و پودر اینولین و پودر ساکارز و سایر مواد شیمیایی مورد نیاز با بالاترین خلوص از شرکت مرک تهیه شدند. به منظور انجام تحقیق دستگاه‌های رفاکتومتر، اسپکتروفتومتر (Hatch، آمریکا)، pH متر (Mettler، MA 235، سوئیس)، ویسکومتر (Brookfield، HADV-TT+Pro، آمریکا)، همزن مغناطیسی با صفحه داغ استیل ضد زنگ (فاطریک، ایران)، ترازو با دقت 0/0001 (PE 160، سوئیس) استفاده شدند.

آماده‌سازی نمونه: ورت حاوی رازک و اینولین به تنهایی یا به همراه ساکارز با نسبت‌های مشخص (اینولین 3٪، اینولین 1/5٪-ساکارز 1/5٪، ساکارز 3٪) تهیه شدند و سپس پاستوریزه (دمای 90°C به مدت 5 دقیقه) و خنک شدند. دی اکسید کربن به بطری‌ها تزریق شده و درب بندی شدند. قوطی‌های ماء‌الشعیر بسته بندی شده در دو دمای 4°C (دمای یخچالی) و 25±2°C (دمای محیط) در مدت 4 ماه نگهداری شده و آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی (pH، بریکس، اسیدیته و رنگ) هر 2 ماه یکبار روی نمونه‌ها انجام شد.

روش‌های اندازه‌گیری شاخص‌های فیزیکی: متغیرهای تحقیق شامل نوع و درصد پری‌بیوتیک و ساکارز است. اندازه‌گیری شاخص‌های pH با دستگاه pH متر، بریکس با دستگاه رفاکتومتر، کدورت و شفافیت با روش

حاوی پری بیوتیک‌های فراسودمند در سراسر دنیا روبه افزایش است (9، 8). غنی‌سازی نوشیدنی‌ها با اجزای فراسودمند جدید همچون پروبیوتیک‌ها (10) و پری بیوتیک‌ها مثل اینولین از پیشرفت‌های اخیر در این راستا است.

مفهوم پری بیوتیک توسط گیسون و رابرفرودید در سال 1995 ارائه گردید بدین صورت که به‌عنوان ترکیبات غذایی غیر قابل هضم که با تحریک انتخابی رشد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری‌ها در کولون، میزبان را به‌طور مفید تحت تأثیر قرار می‌دهند. در تعریف دیگری پری بیوتیک‌ها منابع غذایی کربوهیدراته غیر قابل هضم انتخابی هستند که رشد و تکثیر باکتری‌هایی مانند بیفیدوباکتریوم‌ها و لاکتوباسیل‌ها را تحریک می‌کنند (11) و از طریق کمک به رشد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری‌های مفید در روده بزرگ و حتی روده کوچک، قادر به بهبود سلامت میزبان هستند (13، 12). این کربوهیدرات‌های مقاوم و کوتاه زنجیر به‌عنوان الیگوساکاریدهای غیر قابل هضم و یا کربوهیدرات‌های کم هضم نیز شناخته می‌شوند (14). پپتیدها، پروتئین‌ها و چربی‌ها نیز دارای خصوصیات پری بیوتیک هستند اما بیشترین توجه به کربوهیدرات‌هایی مانند لاکتولوز، اینولین و تعدادی از الیگوساکاریدها جلب شده است (15). مهمترین پری بیوتیک‌ها اینولین و فروکتو الیگو ساکاریدها (FOS) هستند که فیبرهایی محلول و قابل تخمیر بوده و تحت عنوان فروکتان‌ها نامیده می‌شوند (16). از دیگر پری بیوتیک‌ها می‌توان به آرابینوگالاکتان، پنتاهیدرات، بتا گلوکان، الیگوساکارید دانه سویا، مالتودکسترین، پلی دکسترین و خانواده الیگوساکاریدهای رافینوز اشاره کرد (19-17). این ترکیبات توسط آلfa آمیلاز و دیگر هیدرولازها در قسمت بالای مجرای روده هضم نمی‌شوند (20). همچنین این ترکیبات به دلیل مقاوم بودن به اسیدهای معده و آنزیم‌های پانکراس در شرایط درون زیست، در تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند (16). حداقل میزان پری بیوتیک‌ها به منظور اعمال نقش در مواد غذایی جامد (W/W) 3-6٪ و در غذاهای مایع (W/W) 3-1/5٪ پیشنهاد می‌شود (21، 20). شایان ذکر است که پری‌بیوتیک‌ها علاوه بر خواص سلامت‌بخش، قادر به بهبود برخی خواص حسی (به‌ویژه خواص بافتی) در محصولات غذایی هستند و می‌توانند جایگزین نسبی چربی شوند. همچنین، برخی از این ترکیبات، مانند اینولین کوتاه‌زنجیر، طعم نسبتاً شیرین دارند و به‌عنوان جانشین نسبی قند قابل بررسی هستند (22).

یافت. مطابق جدول 2 تغییرات متغیر بریکس در طول زمان از لحاظ آماری معنی‌دار نبودند ($p>0/05$)

در طول مدت نگهداری pH ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت (در هر دو دما pH از 3/81 به 3/85 و سپس به 3/82 تغییر کرد). تغییرات pH در دمای نگهداری 4°C ، در طول مدت نگهداری معنی‌دار بود ($p=0/007$)، در حالی که تغییرات معنی‌داری در pH در طول مدت نگهداری در دمای نگهداری 25°C مشاهده نشد ($p=0/079$).

رنگ تیمارها در دمای نگهداری 4 و 25°C در حین نگهداری، کاهش یافت. در دمای نگهداری 25°C ، ابتدا از 0/151 به 0/147 و سپس به 0/145 تغییر کرده است و در دمای نگهداری 4°C ، ابتدا از 0/151 به 0/147 و سپس به 0/146 تغییر کرده است. تغییرات رنگ در هر دو دما در طول مدت نگهداری معنی‌دار نبودند ($p>0/05$).

نتایج تحقیق بیانگر، افزایش اسیدیته تیمارها در طول مدت نگهداری در دمای 4 و 25°C است. مطابق جدول 2 اسیدیته نمونه‌ها، در طول نگهداری در دمای 25°C ، از 0/136 به 0/137 تغییر کرد و در مدت نگهداری در دمای 4°C ، اسیدیته نمونه‌ها از 0/136 به 0/135 تغییر یافت. تغییرات اسیدیته در طول مدت نگهداری معنی‌دار نبود ($p>0/05$).

همبستگی و ارتباط متغیرهای مورد بررسی در طول نگهداری در دمای 4 و 25°C با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون مربوطه در جدول 3 نشان داده شده است. با توجه به جدول 3 بریکس با pH رابطه‌ی مستقیم و با رنگ رابطه‌ی معکوس دارد. همچنین ارتباط متغیر pH و رنگ با اسیدیته از نوع معکوس است.

اسپکتروفتومتری (Hatch، امریکا) در طول موج 540 نانومتر، اسیدیته قابل تیتر با روش تیتراسیون انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری: با توجه به کم بودن حجم نمونه در گروه‌ها و نرمال نبودن توزیع متغیرها از آزمون‌های ناپارامتری استفاده شد. از این‌رو تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق با نرم‌افزار SPSS 19 و آزمون فریدمن برای بررسی تغییرات متغیرهای مورد بررسی (بریکس، pH، رنگ، اسیدیته) در بین 4 گروه مورد نظر (گروه شاهد، اینولین، اینولین- ساکارز و ساکارز) در طول زمان انجام شد. همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون مربوط به آن برای بررسی همبستگی و ارتباط متغیرهای مورد نظر استفاده شد. تیمارها در سه تکرار انجام گردیدند و نتایج حاصل گزارش شدند.

• یافته‌ها

جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی (بریکس، pH، رنگ، اسیدیته) بر حسب زمان و دمای نگهداری را نشان می‌دهد.

بررسی روند تغییرات متغیرهای مورد بررسی در مدت نگهداری: تغییرات متغیرهای مورد بررسی در طول نگهداری و به تفکیک دما مطابق جدول 2 با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد و سپس اثر زمان مورد آزمون قرار گرفت. همچنین به منظور انجام مقایسه بهتر، میانگین تغییرات متغیرها در نمونه‌ها به تفکیک ارائه و مقادیر انحراف معیار گزارش شد.

با توجه به جدول 2 مقدار بریکس در دمای نگهداری 25°C به طور میانگین از میزان 7/23 به 7/18 در طول مدت نگهداری کاهش یافت. این موضوع در حالی است که میزان بریکس در دمای نگهداری 4°C ابتدا کاهش و سپس افزایش

جدول 1. گزارش توصیفی از متغیرهای مورد بررسی بر حسب زمان و دمای نگهداری

متغیر مورد بررسی	بریکس	pH	رنگ	اسیدیته
زمان	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD	mean $\pm$ SD
صفر	7/23 $\pm$ 1/350	3/81 $\pm$ 0/040	0/151 $\pm$ 0/010	0/136 $\pm$ 0/007
یک ماه - 25°C	7/20 $\pm$ 1/170	3/85 $\pm$ 0/030	0/147 $\pm$ 0/010	0/137 $\pm$ 0/009
یک ماه - 4°C	7/18 $\pm$ 1/190	3/85 $\pm$ 0/040	0/147 $\pm$ 0/010	0/136 $\pm$ 0/003
دو ماه - 25°C	7/18 $\pm$ 1/020	3/82 $\pm$ 0/030	0/145 $\pm$ 0/010	0/137 $\pm$ 0/009
دو ماه - 4°C	7/38 $\pm$ 1/260	3/82 $\pm$ 0/030	0/146 $\pm$ 0/010	0/135 $\pm$ 0/010

جدول 2، بررسی تغییرات متغیرهای مورد آزمون در طول مدت نگهداری در دمای 4 و 25°C

متغیر مورد آزمون	دمای نگهداری (°C)	زمان مورد بررسی	زمان صفر	زمان یک‌ماه	زمان دو ماه	مقدار آماره آزمون فریدمن	p-value
بریکس	25	شاهد	5/1±0/001	5/3±0/001	5/5±0/001	0/0001	0/999
		اینولین	8/3±0/001	8/0±0/001	7/9±0/001		
		اینولین - ساکارز	8/0±0/001	7/9±0/001	7/8±0/001		
		ساکارز	7/5±0/001	7/5±0/001	7/5±0/001		
		در کل	7/23±1/350	7/20±1/170	7/18±1/190		
	4	شاهد	5/1±0/001	5/2±0/001	5/3±0/001	3/714	0/156
		اینولین	8/3±0/001	7/9±0/001	8/3±0/001		
		اینولین - ساکارز	8/0±0/001	7/8±0/001	8/0±0/001		
		ساکارز	7/5±0/001	7/8±0/001	7/9±0/001		
		در کل	7/23±1/350	7/18±1/020	7/38±1/260		
pH	25	شاهد	3/79±0/001	3/82±0/001	3/85±0/001	5/067	0/079
		اینولین	3/86±0/001	3/88±0/001	3/84±0/001		
		اینولین - ساکارز	3/84±0/001	3/84±0/001	3/80±0/001		
		ساکارز	3/78±0/001	3/87±0/011	3/79±0/001		
		در کل	3/81±0/040	3/85±0/030	3/82±0/030		
	4	شاهد	3/79±0/001	3/79±0/001	3/78±0/001	9/867	0/007
		اینولین	3/86±0/001	3/88±0/001	3/85±0/001		
		اینولین - ساکارز	3/84±0/001	3/87±0/001	3/85±0/001		
		ساکارز	3/78±0/001	3/84±0/011	3/80±0/032		
		در کل	3/81±0/040	3/85±0/040	3/82±0/030		
رنگ	25	شاهد	0/142±0/002	0/142±0/011	0/140±0/002	2/4	0/058
		اینولین	0/160±0/011	0/151±0/022	0/148±0/025		
		اینولین - ساکارز	0/153±0/006	0/150±0/044	0/147±0/013		
		ساکارز	0/149±0/004	0/145±0/046	0/144±0/031		
		در کل	0/151±0/010	0/147±0/030	0/145±0/030		
	4	شاهد	0/142±0/002	0/141±0/014	0/141±0/062	1/001	0/07
		اینولین	0/160±0/011	0/151±0/037	0/149±0/011		
		اینولین - ساکارز	0/153±0/006	0/149±0/027	0/148±0/031		
		ساکارز	0/149±0/004	0/147±0/031	0/145±0/018		
		در کل	0/151±0/010	0/147±0/030	0/146±0/050		
اسیدیته	25	شاهد	0/147±0/001	0/148±0/001	0/150±0/001	2/5	0/058
		اینولین	0/130±0/001	0/131±0/001	0/131±0/001		
		اینولین - ساکارز	0/131±0/004	0/132±0/001	0/133±0/001		
		ساکارز	0/137±0/001	0/138±0/001	0/138±0/001		
		در کل	0/136±0/007	0/137±0/004	0/137±0/003		
	4	شاهد	0/147±0/001	0/148±0/001	0/149±0/001	1/5	0/08
		اینولین	0/130±0/001	0/131±0/001	0/132±0/001		
		اینولین - ساکارز	0/131±0/004	0/132±0/001	0/133±0/001		
		ساکارز	0/137±0/001	0/138±0/001	0/138±0/001		
		در کل	0/136±0/007	0/136±0/003	0/135±0/004		

جدول 3. بررسی همبستگی متغیرهای مورد بررسی در طول نگهداری در دمای 4 و 25°C

ضریب همبستگی اسپیرمن (p-value)	بریکس	pH	رنگ	اسیدیته
بریکس	-	-	-	-
pH	0/310* (0/020)	-	-	-
رنگ	-0/288* (0/043)	0/080 (0/579)	-	-
اسیدیته	-0/024 (0/859)	-0/507* (<0/0001)	-0/546** (<0/0001)	-

* در $p=0/05$ معنی دار است
 ** در $p=0/1$ معنی دار است

• بحث

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد، اینولین بر ویژگی‌های فیزیکی عصاره مالت اثر مثبتی دارد و جایگزین مناسبی برای ساکارز است. همچنین Renuka و همکاران (2009) در تحقیقی فروکتوالیگوساکاریدها را به سه آب میوه آناناس، انبه و پرتقال اضافه کردند و نتیجه گرفتند فروکتوالیگوساکاریدها می‌توانند بدون آن‌که در کیفیت نهایی محصول تغییر معنی‌داری ایجاد کنند، به صورت نسبی جایگزین ساکارز گردند (24). در مطالعه آن‌ها pH، اسیدیته قابل تیتراژ، مواد جامد محلول کل و رنگ طی دوره نگهداری 6 ماهه تغییر معنی‌داری نداشت.

نتایج تحقیق نشان داد تغییرات بریکس در طول مدت نگهداری به میزان اینولین افزوده شده در تیمارها بستگی داشت، تیمارهای دارای 3% اینولین بیشترین و تیمار شاهد کمترین میزان بریکس را دارا بودند. در هر یک از تیمارها، مقدار شاخص مورد بحث طی دوره نگهداری از نظر آماری ثابت بود که حاکی از عدم تجزیه‌ی اینولین در نوشیدنی مالت تا اندازه‌ای است که بر بریکس اثر معنی‌دار نداشته باشد.

افزودن اینولین و کاهش مقدار ساکارز بر روی pH نمونه‌ها در طول مدت نگهداری تغییر معنی‌داری ایجاد نکرد، بدین گونه که ابتدا در زمان‌های اولیه pH در نمونه‌های حاوی اینولین بیشترین مقدار ولی با گذشت زمان pH کاهش یافت. روند تغییرات pH در طول مدت نگهداری محسوس نبود ولی در نمونه‌های اینولین 3% نسبت به اینولین 1/5% میزان pH کمتر کاهش یافت. این مشاهده با نتایج ناشی از تحقیقات Renuka و همکاران در 2009 مطابقت داشت (24). همچنین

مظلومی و همکاران در سال 1389 اثر اینولین را به عنوان جایگزین چربی بر روی خواص حسی و بافتی ماست کم چرب مورد مطالعه قرار دادند و نتایج تحقیقاتشان نشان داد افزودن اینولین به طور جزئی سبب کاهش pH می‌گردد (25). Morisse و همکاران در سال 1993 بیان کردند اینولین منجر به کاهش pH و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر می‌شود و باعث کاهش میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا در بدن می‌گردد (26). Nazzaro و همکارانش در مطالعه خود بر روی آب هویج به این نتیجه رسیدند که افزودن اینولین منجر به کاهش pH و ایجاد محیط اسیدی می‌گردد و همچنین در طول تخمیر مقدار گلوکز و ساکارز به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد (27). تغییرات اسیدیته در طول مدت نگهداری در هر دو دمای 4°C و 25°C، در سطح معنی‌دار نبود ($p \geq 0/05$). کاهش میزان اینولین منجر به افزایش اسیدیته شده است. بدین صورت که نمونه‌های حاوی 1/5 درصد اینولین اسیدیته بالاتری نسبت به اینولین 3% داشتند. بنابراین از آنجا که قندهای مورد استفاده خنثی بوده و یونیزه نمی‌شوند و همچنین نمونه‌ها از نظر آلودگی میکروبی پاک بوده‌اند، شاخص‌های یادشده تغییر معنی‌دار نداشته‌اند.

تغییرات رنگ در طول مدت نگهداری در دو دمای 4°C و 25°C معنی‌دار نبود ($p \geq 0/05$). با توجه به بررسی‌های انجام شده با افزایش میزان قند اینولین، کدورت نوشیدنی مالت افزوده می‌شود، به طوری که بیشترین شفافیت در پایان دوره نگهداری مشاهده گردید. در تمامی تیمارها در طی دوره نگهداری، میزان شفافیت محصول افزایش می‌یابد که

کاهش درجه درخشندگی سبب می شود شکلات، تیره تر به نظر برسد (28).

به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد اینولین به عنوان یک پری بیوتیک با ویژگی های سلامت بخش فراوان می تواند با بهبود ویژگی های فیزیکی شیمیایی عصاره مالت، جایگزین مناسبی برای ساکارز در نظر گرفته شود که سبب بهبود سلامت جامعه از طریق کاهش مصرف ساکارز در رژیم غذایی می گردد.

دلیل آن کاهش قند کل در تیمارها طی دوره نگهداری است. میزان قند کمتر در تیمار شاهد دلیل سرعت بیشتر روند افزایش شفافیت در طول مدت نگهداری در دو دمای 4°C و 25°C است که متعاقباً میزان کاهش قند کمتری را طی دوره نگهداری در پی داشت. شوریده و همکاران در سال 1389 در تحقیقی اثر افزودن اینولین بر روی ویژگی های شکلات تیره بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اینولین به دلیل جذب آب باعث کاهش پراکنش نور و در نتیجه با

• References

- Hardwick WA. An overview of beer making. In: Handbook of brewing, WA. Hardwick (Ed.). Marcel Dekker, USA; 1995: 87-96.
- Sohrabvandi S, Mousavi ME, Razavi SH, Mortazavian AM, Rezaei K. Alcohol-free Beer: Methods of Production, Sensorial Defects, and Healthful Effects. Food Res Inter 2010;26:335-52.
- Esmaili S, Mortazavian A, Khosravi-Darani K, Sohrabvandi S. Utilization of membrane systems in beer processing. J Paramed Sci 2015; 6 (2): 149-56.
- Gerhauser C. Beer constituents as potential cancer chemopreventive agents. Eur J Cancer 2005;41:1941-54.
- Fantozzi P, Montanari L, Mancini F, Gasbarini A, Addolorato G, Simoncini M, et al. In vitro antioxidant capacity from wort to beer. Lebensm-Wiss U Technol 1998;31:221-7.
- Bamforth CW. Nutritional aspects of beer-a review. Nutr Res 2002; 22: 227-37.
- Hardwick WA. The properties of beer. In: W. A. Hardwick, editor. Handbook of Brewing. New York, USA: Marcel Dekker; 1994.
- Mark-Herbert C. Innovation of a new product category. Technovation 2004; 24: 713-9.
- Verbeke W. Consumer acceptance of functional foods: sociodemographic cognitive and attitudinal determinants. Food Qual Prefer 2005;16(1):45-57.
- Luckow T, Sheehan V, Fitzgerald G, Delahunty C. Exposure, health information and flavour-masking strategies for improving the sensory quality of probiotic juice. Appetite 2006;47:315-23.
- Roberfroid M. Functional food concept and its application to prebiotics. Digestive and Liver Disease 2002;34(2):S105-S10.
- Vasiljevic T, Shah NP. Cultured milk and yoghurt. Chandan RC, Kilara A, and Shah NP, editors. Ames, Iowa: Blackwell Publishing; 2008.
- Saarela M, Mogensen G, Fondén R, Mättö J, Mattila-Sandholm T. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. J Biotechnol 2000;84(3):197-215.
- Holzappel WH, Schillinger U. Introduction to pre- and probiotics. Food Res Inter 2002;35:109-16.
- Prado FC, Parada JL, Pandey A, Soccol CR. Trends in non-dairy probiotic beverages. Food Res Inter 2008;41(2):111-23.
- Donkor ON, Nilmini SLI, Stolic P, Vasiljevic T, Shah NP. Survival and activity of selected probiotic organisms in set-type yoghurt during cold storage. Inter Dairy J 2007;17(6):657-65.
- Oliveira RPS, Perego P, Converti A, Oliveira MN. Growth and acidification performance of probiotics in pure culture and co-culture with Streptococcus thermophilus: The effect of inulin. LWT - Food Sci Technol 2009;42:1015-21.
- Su P, Henriksson A, Mitchell H. Selected prebiotics support the growth of probiotic mono-cultures in vitro. Anaerobe 2007;13:134-9.
- Martinez-Villaluenga C, Frias J, Gomez R, Vidal-Valverde C. Influence of addition of raffinose family oligosaccharides on probiotic survival in fermented milk during refrigerated storage. Inter Dairy J 2006;16:768-74.
- Oliveira RPS, Perego P, Converti A, Oliveira MN. Effect of inulin on growth and acidification performance of different probiotic bacteria in co-cultures and mixed culture with Streptococcus thermophilus. J Food Eng 2009;91:133-9.
- Sohrabvandi S. Optimization of maltol-free beer production produced with restricted fermentation practice. Ph. D Thesis University of Tehran; 2008.
- Sohrabvandi S, Mortazavian AM, Rezaei K. Advanced Analytical Methods For The Analysis of Chemical And Microbiological Properties of Beer. J Food Drug Anal 2011;19(2):1-21.
- Guarner F. Inulin and oligofructose: impact on intestinal diseases and disorders. British J Nutr 2005;93(1):61-5.
- Renuka B, Kulkarni SG, Vijayanand P, Prapulla SG. Fructooligosaccharide fortification of selected fruit juice

- beverages: Effect on the quality characteristics. *LWT - Food Sci Technol* 2009;42:1031-3.
25. Mazloomi SM, Shekarforoush SS, Ebrahimnejad H, Sajedianfard J. Effect of adding inulin on microbial and physicochemical properties of low fat probiotic yogurt. *Iranian J Vet Res Shiraz Uni* 2011; 12 (2): 93-8.
26. Morisse JP, Maurice R, Boiletot E, Cotte JP. Assessment of the activity of fructooligosaccharide on different cecal parameters in rabbits experimentally infected with *E. coli* O103. *Ann Zootech* 1993;42:81-87.
27. Nazzaro F, Fratianni F, Sada A, Orlando P. Synbiotic potential of carrot juice supplemented with *Lactobacillus* spp. and inulin or fructooligosaccharides. *J Sci Food Agri* 2008;88(13): 2271-6.
28. Shoorideh M, Taslimi A, Azizi MH, Mohammadifar MA. Study of effects of D-tagatose and inulin as sugar substitutes on the physical, chemical and rheological properties of milk chocolate. *J Food Sci Technol* 2011; 8(29): 113-2527. [In Persian].

Short Communication

The Effect of Inulin on the Qualitative Characteristics of Malt Beverage during Storage at Different Temperatures

Esmaeili S¹, Vaez E², Yassini A², Mortazavian A.M³, Sohrabvandi S^{4*}, Ferdosi R⁵, Khosravi-Darani K⁶

1- MSc, Dept. of Food Science and Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Yazd, Iran

3- Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4- *Corresponding author: Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Email: sohrabv@sbmu.ac.ir

5- Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6- Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received 5 Nov, 2015

Accepted 6 Mar, 2016

Background and Objectives: Malt extract (because of specific sensory and nutritional properties) is one of the most widely consumed beverages in the world. Enrichment of beverages with functional ingredients such as prebiotics as a substitutive of sucrose can be used to improve public health practice. So, the aim of this research is production of prebiotic malt extract in laboratory scale by replacing sucrose with inulin and investigating its physicochemical properties.

Materials & Methods: Malt with Razak and inulin alone or in combination with sucrose with specific ratios (inulin 3%, inulin 1.5%, sucrose 1.5%, and sucrose 3%) were prepared, and after pasteurization, maintained at 4 and 25 °C for every 2 months (4 months). Then physical and chemical tests (including pH, Brix, pH and color) were done on the samples.

Results: The Brix of samples correlated with the amount of inulin. The samples with maximum and minimum levels of Brix were inulin 3% and control, respectively. Also addition of inulin, and consequently, reducing the amount of sucrose led to decreasing the samples' pH during storage ($p\text{-value} \geq 0.05$). At the beginning, pH in the samples containing inulin was the highest, which was decreased during the storage time. In all cases, the pH levels were not changed significantly but in the samples with inulin 3% compared to inulin 1.5%, the pH levels were less decreased. Moreover, the reducing amount of inulin caused increasing the acidity of the samples. According to investigations, the increased amount of inulin was correlated with increasing the color and turbidity of the samples because of reducing light scattering. The changes of color during storage at 4 and 25 °C were not significant ($p\text{-value} \geq 0.05$).

Conclusion: The results showed that addition of inulin to malt extract had no significant adverse effect on the physicochemical properties of the product. However, it could improve the nutritional characteristic of the product by production of a probiotic beverage, and thus have health effects on the public health and be an effective suitable alternative of sucrose.

Keywords: Malt extract, Prebiotic, Inulin