

اثر نوع آرد، روش انجماد و مدت نگهداری بر کیفیت نان برابری حاصل از خمیر منجمد

محمد رضا کوشکی^۱، صادق خوشگذران آبرس^۲، محمد حسین عزیزی^۳

۱- نویسنده مسئول: استادیار گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انسستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پژوهی شهید بهشتی، پست الکترونیکی: mr_koushki@yahoo.com

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش: ۸۹/۴/۱۳

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۲/۱۷

چکیده

سابقه و هدف: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، بخش قابل ملاحظه‌ای از نان‌های تولیدی در کشور ضایع می‌شود. این ضایعات عمدتاً ناشی از عوامل مختلف از جمله نحوه عمل آوری خمیر است. بنابراین امکان تولید نان از خمیر منجمد جهت کاهش چنین ضایعاتی مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: خمیرها به روش مستقیم از آرد ستاره قوی و ضعیف تهیه و به تونل انجماد 35°C -۳۰- (انجماد سریع) و فریزر خانگی 18°C -۲۰- (انجماد کند) منتقل گردیدند. پس از تکمیل فرایند انجماد در بسته‌بندی‌های دولایه پلی‌اتیلنی قرار گرفتند و به فریزر 18°C -انتقال داده شدند. خمیرهای منجمد در زمان‌های ۲۴، ۲۴، ۷۲ ساعت و یک‌هفته، از انجماد خارج و روی آنها آزمون اکستنسوگراف انجام شد. سپس از خمیرهای مذکور نان‌های برابری پخته شد و پس از انجام ارزیابی‌های حسی روی آنها، برای انجام ارزیابی بیاتی در یک دوره ۱ تا ۴ روزه مجدداً در بسته‌بندی‌های دولایه پلی‌اتیلن قرار گرفتند و در شرایط محیطی نگهداری شدند.

یافته‌ها: مدت نگهداری به جز فاکتور تغییرات انرژی با فاکتورهای قابلیت کشش، مقاومت به کشش و ضربی D تفاوتی معنی‌دار داشت ($p < 0.05$). نوع آرد به جز فاکتور ضربی D، فاقد اثری معنی‌دار بر فاکتورهای قابلیت کشش، مقاومت به کشش و تغییرات انرژی بود. در ارزیابی حسی، نوع آرد و روش انجماد بر شکل نان و پوسته سطح فوقانی نان دارای اثری معنی‌دار داشت ($p < 0.05$). همچنین نوع آرد با خصوصیات پوسته سطح زیرین، قابلیت جویدن و صفت بو، طعم و مزه نان ارتباط معنی‌دار داشت. نوع آرد، روش انجماد و مدت نگهداری بر تخلخل، سفتی بافت و بیاتی اثر معنی‌داری نداشتند.

نتیجه‌گیری: نان حاصل از خمیر منجمد آرد قوی به روش انجماد سریع می‌تواند جایگزینی مناسب برای خمیر تازه محسوب گردد.

واژگان کلیدی: خمیر منجمد، اکستنسوگراف، فارینوگراف، نان برابری، ارزیابی حسی، بیاتی

• مقدمه

خمیر، شرایط پخت، عدم استفاده از مواد بهبوددهنده و همچنین عدم اصلاح نحوه نگهداری نان توسط مصرف‌کننده است.^(۲)

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان نان‌ها را به دو گروه عمده تقسیم کرد: نان‌های مسطح و نازک و نان‌های حجیم. نان مسطح نازک اولین نانی است که توسط انسان تهیه شد ولی به تدریج با شناخته شدن روش تهیه نان و به وجود آمدن فن نانوایی، تنوع بیشتری در فرم، شکل و نوع نان بوجود آمد.^(۳)

از گذشته تاکنون غلات به شکل‌های مختلف، پایه اصلی تغذیه بخش اعظمی از جمیعت جهان را تشکیل می‌دهند. در این میان نان گندم یکی از رایج‌ترین نان‌ها به شمار می‌آید. نان در میان بعضی جوامع چون مسلمانان و یهودیان از نوعی قداست خاص برخوردار است. نان روزانه قسمت اعظم انرژی، پروتئین، املاح و ویتامین‌های گروه B را تأمین می‌کند.^(۱) براساس بررسی‌های به عمل آمده بخش قابل ملاحظه‌ای از نان‌های تولیدی در کشور ضایع می‌گردد. این ضایعات ناشی از کیفیت گندم، آردهای مصرفی، عمل آوری نامناسب

آسیب سلول‌های مخمر و بافت گلوتونی خمیر می‌گردد. وی انجامد سریع و انجامد به طریق کرایوژنیک به وسیله دی‌اکسیدکربن را توصیه می‌کند (۹). در طول نگهداری خمیر به صورت منجمد، تمایل کریستال‌های یخ برای به حداقل رساندن نسبت سطح به حجم، باعث تشکیل کریستال‌های بزرگ یخ می‌شود (۱۰، ۵). بنابراین استفاده از تجهیزات نگهداری مناسب برای حفظ دمای ثابت و جلوگیری از کاهش کیفیت در طول نگهداری و توزیع به حالت منجمد امری ضروری است (۷، ۵).

در این تحقیق اثر نوع آرد، روش انجامد و مدت نگهداری بر ویژگی‌های خمیر منجمد و استفاده از خمیر حاصل در تهیه نان برابری، به عنوان راهی جایگزین در جهت رسیدن به کیفیت مناسب و کاهش ضایعات نان مورد بررسی قرار گرفت.

• مواد و روش‌ها

مواد : آرد گندم مورد استفاده در این تحقیق، آرد ستاره با کیفیت قوی و ضعیف (بر اساس مقدار پروتئین و خصوصیات رئولوژیکی آن) بود. مخمر خشک (مرکز پژوهش‌های غلات، ایران، شرکت هنری سایمون). پاکت‌های پلاستیکی از جنس پلی‌اتیلن به ابعاد $20 \times 15 \text{ cm}$ (از بازار تهران خریداری شدند). آب (برای تعیین مقدار بهینه آب آزمون فارینوگراف روی آردهای گندم انجام گرفت)، نمک (تصفیه شده، بازار) و اسید‌اسکوربیک (مرک، آلمان) نیز خریداری شدند.

آزمون تعیین میزان فعالیت مخمر (فشارسنج سایمون): برای تعیین فعالیت مخمر، ابتدا $0/38 \text{ g}$ از مخمر مورد نظر با 10 g آرد و سپس با 7cc آب 37°C به خوبی مخلوط شد. سپس خمیر به دست آمده را در محفظه مخصوص در آب 37°C گذاشته و فشارسنج به آن متصل شد. در زمان‌های متوالی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ساعت فشار گاز بر حسب سانتی‌متر جیوه خوانده شد و با مقایسه با جدول ارائه شده توسط شرکت هنری سایمون میزان قدرت مخمر تخمین زده شد. مقایسه نتایج آزمایش با جدول راهنمای هنری سایمون نشان داد که مخمر مورد استفاده، در گروه متوسط تا قوی قرار دارد.

از میان نان‌های مسطح، نان برابری از نظر فرم، شکل و حجم با نان‌های دیگر متفاوت است و می‌توان آن را نانی نیمه‌حجیم در نظر گرفت، زیرا پوسته فوقانی و سطح زیرین نان به وسیله بافت کم‌حجیمی از هم جدا می‌شوند. با توجه به این موضوع، در این مطالعه خمیر نان برابری برای انجامد انتخاب شده است.

بازار خمیر منجمد در سال‌های اخیر به دلیل تقاضای مصرف کنندگان برای نان، با کیفیت بالا و مناسب رونق یافته است و اهداف آن عبارتند از: بهبود کیفیت، افزایش مدت ماندگاری، سازماندهی فعالیت نانوایی‌ها و کاهش یا حذف کامل شیفت شب (۵). امروزه نانوایی‌ها برای تولید نان تازه از خمیر منجمد استفاده می‌کنند که انتخابی اقتصادی و مناسب جهت تولید نان با کیفیت بالا و مدت ماندگاری طولانی با ویژگی‌های ارگانولوپتیک مناسب است (۶). استفاده از خمیر منجمد امکان تولید، توزیع و نگهداری مرکز خمیر به صورت منجمد را در مقیاس صنعتی فراهم می‌سازد (۷)، در نتیجه خمیر منجمد را می‌توان در مقادیر زیاد به مکان‌های دور از محل تولید، نظیر رستوران‌های محلی یا مراکز خرده‌فروشی، ارسال کرد و این باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های تجهیزات و کارگری است (۸).

انجامد خمیر نان از لحاظ اقتصادی و نگهداری مزایایی دارد. با این وجود، این روش اثراتی تخریبی بر ساختار خمیر و سلول‌های مخمر می‌گذارد. مطالعات میکروسکوپی الکترونی، شکست در شبکه گلوتونی در طی انجامد یا رفع انجامد را نشان دادند که نتیجه تشکیل کریستال‌های درشت و کاهش قدرت نگهداری گاز و حجم نان تولیدی است (۸). آسیب به غشای مخمر از طریق انجامد و رفع انجامد، ترکیبات احیاء کننده را آزاد می‌سازد که باعث تضعیف خمیر می‌گردد (۷، ۸). انجامد سریع منجر به تشکیل کریستال‌های ریز یخ می‌شود و اثری نامطلوب بر پیوستگی شبکه گلوتون نمی‌گذارد. با این وجود انجامد سریع زنده‌مانی مخمر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی باید سرعت انجامد بهینه انتخاب شود تا امکان ایجاد فوری هسته کریستال‌ها و کاهش شوک Bauermann (۵) خاطر نشان کرد که انجامد کند، به دلیل سرعت پایین، باعث تشکیل کریستال‌های درشت یخ و به دنبال آن

جدول ۱- میزان تولید گاز دیاکسیدکربن توسط مخمر در طی زمان

ساعت	فشار گاز CO_2 (cm Hg)	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم
	۱۵	۲۲	۳۴	۳۸	۴۸	۴۸

(مخلوطی از آب ولرم و روغن و جوش‌شیرین و آرد) افزوده شد. در مرحله بعد با فروبردن انگشتان در خمیرهای آماده‌شده، شیارهایی در سطح آنها ایجاد شد. این عمل علاوه بر آنکه باعث نازک‌تر شدن چانه‌ها می‌شود، شکل ظاهری مناسبی نیز به آنها می‌دهد. پس از این برای آنکه چانه‌ها مرحله تخمیر نهایی را پشت سر بگذارند، به مدت ۱۰ دقیقه به حال خود رها شدند. پخت در تنور گندی‌شکل در دمای 240°C - ۲۲۰ به مدت ۱۲ دقیقه انجام گرفت (۱۷). پس از آنکه نان‌ها از تنور خارج شدند، به مدت ۲۰ دقیقه داخل قفسه‌های مشبك قرار داده می‌شوند تا به آرامی خنک شوند. پس از انجام ارزشیابی ارگانولیپتیکی، نان‌ها در کیسه‌های پلی‌اتیلن دولایه بسته‌بندی شده و در شرایط محیطی برای انجام ارزیابی بیاتی نگهداری می‌گردند.

ارزیابی حسی نان: ارزیابی نان‌های سنتی ایران از طریق بررسی نظرات اخذشده از هفت نفر داور آموزش‌دیده جهت تعیین معیارهای کیفی و ضرایب انجام گردید و اهمیت هر یک از این معیارها با توجه به ویژگی نان‌ها طبقه‌بندی شد (۱۸).

ارزیابی بیاتی نان: برای ارزیابی بیاتی نان از روش مصوب AACCC (۳۰-۷۴) که توسط «بچل» «ارائه شده است استفاده شد (۱۱).

روش‌های آماری: برای بررسی آماری نتایج و شناسایی بهترین نوع آرد و روش انجامد، از آزمون فاکتوریل در غالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. علت استفاده از چنین طرحی تأثیر فاکتور نوع آرد در دو سطح قوی و ضعیف و نوع انجامد در سه سطح فاقد انجامد، کند و سریع و فاکتور زمان در ۴ سطح ۷۲، ۴۸، ۲۴، ۴ سطح فاکتور نوع انجامد و اثر متقابل سه فاکتور مذکور بود. در مجموع دو سطح فاکتور نوع آرد و ۴ سطح فاکتور زمان و سه سطح فاکتور نوع انجامد در کل ۲۴ تیمار طرح را تشکیل می‌دادند و از آنجایی که برای هر تیمار ۱۰ تکرار انجام شده بود، ۲۴۰ یافته برای هر صفت به دست آمد. نتایج به دست آمده پس از آنالیز واریانس با آزمون دانکن مقایسه شدند. از کلیه نتایج به دست آمده مقایسه میانگین به روش LSD به عمل آمد (۱۹).

روش‌ها: مقدار رطوبت، مقدار خاکستر، مقدار پروتئین، مقدار فیبر خام آرد گندم، چربی آرد گندم، مقدار گلوتن مرتبط آرد، آزمون فارینوگراف و آزمون اکستنسوگراف به ترتیب با استفاده از روش‌های مصوب (۲۰۰۰) AACC به ترتیب با استفاده از روش‌های مصوب (۱۰-۳۲، ۱۰-۱۷، ۰۸-۰۱، ۴۶-۴۴-۱۶) شدت رنگ با استفاده از روش کنت-جونز و آموس (۱۹۶۷) انجام شد. مقدار عدد رسوی یا عدد زلنج و اندازه‌گیری عدد فالینگ از روش‌های استاندارد ICC به شماره ۱۱۶ و ۱۰۷ انجام گرفت.

آماده‌سازی خمیر منجمد و تهیه نان: برای تهیه خمیر از روش مستقیم استفاده شد (۱۲، ۱۳). به این صورت که تمامی ترکیبات بر اساس ۱۰۰ کیلوگرم وزن آرد ستاره شامل آب (بر اساس جذب آب فارینوگراف)، مخمر (۲-۰/۸٪)، نمک (۱/۸٪) و اسید‌اسکوربیک (۱٪) به‌طور همزمان به مخلوط کن منتقل شدند. پس از مخلوط شدن کامل ترکیبات و تهیه خمیر مناسب، آن را درون تشت قرار داده و به‌وسیله پارچه نمناک پوشانده و حدود ۲ ساعت در دمای محیط نگهداری شد. پس از انجام مرحله تخمیر، خمیرها به صورت چانه‌های 40°C گرمی توزین و برای طی مرحله تخمیر میانی به مدت ۱۵ دقیقه، ساکن برروی میز قرار داده شدند و سپس به تونل انجامد با دمای 35°C -تا-۳۰- منتقل شدند (۱۴). بعد از سپری شدن 75°C دقیقه خمیر منجمد شد، به‌طوری که مغز خمیر، دمای 15°C -تا-۱۰- 15°C (توسط دماسنجدیجیتالی) را نشان داد. سپس خمیرهای منجمد در کیسه‌های پلی‌اتیلن دولایه بسته‌بندی و به فریزر 18°C - برای نگهداری تا زمان پخت منتقل شدند (۱۵، ۱۶). برای انجامد کند از فریزر خانگی استفاده شد (20°C -تا-۱۸-)< که فرایند انجامد در مدت $3/5$ ساعت تکمیل شد. خمیر بدون انجامد و تازه تهیه شده به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. $24، 48، 2\text{--}22$ ساعت و یک هفته بعد از انجامد، خمیرها برای رفع انجامد در دمای محیط قرار داده شدند، که این فرایند حدود $2/5$ ساعت طول کشید. پس از انجام آزمون اکستنسوگراف، چانه‌های آماده از دو طرف کشیده شدند و بر روی هر خمیر پهن شده، رومال

اثر تیمارها (نوع آرد و مدت نگهداری) بر خصوصیات

اکستنسوگرام خمیر منجمد: مدت نگهداری به شکل معنی‌داری بر فاکتورهای قابلیت کشش، مقاومت به کشش و ضریب D همچنین نوع آرد، قابلیت کشش، مقاومت به کشش (به جز زمان‌های ۷۲ ساعت و یک هفته) و تغییرات انرژی بر تمامی نمونه‌ها تأثیر گذاشت ($p < 0.05$). تمامی نمونه‌ها قابلیت کشش بالاتر و مقاومت به کشش و تغییرات انرژی پایین‌تری نسبت به خمیر شاهد (بدون انجام، تازه ساخته شده) داشتند. فاکتور ضریب D خمیر نمونه شاهد آرد قوی نسبت به تمامی نمونه‌های آرد قوی و خمیر نمونه شاهد آرد ضعیف نسبت به تمامی نمونه‌های آرد ضعیف پایین‌تر بود (جدوال ۵ و ۶). فاکتور قابلیت کشش از زمان ۲۴ ساعت تا یک هفته برای هر دو نوع آرد افزایش نشان داد. در فاکتورهای مقاومت به کشش و ضریب D کاهش مشاهده شد. مدت نگهداری با فاکتور تغییرات انرژی تعامل معنی‌داری نداشت. نوع آرد به شکل معنی‌داری، فاکتور ضریب D را تحت تأثیر قرار داد، به گونه‌ای که فاکتور ضریب D آرد قوی بالاتر از آرد ضعیف بود.

• یافته‌ها

خصوصیات کلی آردهای گندم: جدول ۲ خصوصیات آردهای گندم استفاده شده را نشان می‌دهد. پروتئین گندم در آرد نقش عمده‌ای را در کیفیت و حجم نان حاصل از خمیر منجمد ایفا می‌کند. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، درصد پروتئین آرد قوی و ضعیف، به ترتیب ۱۰/۰٪ و ۱۱/۹٪ است.

نتایج حاصل از فارینوگرام خمیر آردهای گندم: میزان آب مورد نیاز، بسته به نوع آرد و روش تهیه خمیر متغیر است. برای تعیین مقدار بهینه آب آزمون فارینوگراف روی آردهای گندم انجام گرفت. جذب آب بهینه فارینوگراف و زمان لازم جهت گسترش خمیر، به ترتیب، برای آرد قوی ۶۰/۶٪ و ۴ دقیقه، و برای آرد ضعیف ۲/۴۵٪ و ۵۹/۸ دقیقه بود. جدول ۳ مشخصات فارینوگرام خمیر آردهای گندم را نشان می‌دهد.

نتایج حاصل از اکستنسوگرام خمیر آردهای گندم: جدول ۴ نتایج حاصل از انجام آزمون اکستنسوگراف روی آردها را نشان می‌دهد و همان‌طور مشاهده می‌شود، مقدار ضریب D در آرد قوی نسبت به آرد ضعیف بالاتر است.

جدول ۲ - خصوصیات آردهای گندم

نوع آرد	% رطوبت	(درصد در خشک)	% خاکستر (درصد در خشک)	% فیبر (درصد در خشک)	(درصد در ماده خشک)	% پروتئین (درصد در ماده خشک)	عدد رسوی (ml)	رنت (واحد کنت جوز)	٪ گلوتون مرطوب (ماده خشک)	عدد فالینگ (s)
قوی	۱۲/۱۱	۰/۹۹	۰/۶۵	۱/۴۸	۲۷/۵	۵/۶	۲۲	۵۳۹		
ضعیف	۱۱/۲۰	۰/۹۸	۰/۶۳	۱/۵۱	۲۵	۴/۸	۱۸	۵۲۲		

جدول ۳ - نتایج حاصل از فارینوگرام خمیر آردهای گندم قبل از انجام

نوع آرد	میزان جذب آب (%)	زمان گسترش خمیر(min)	زمان مقاومت	درجه سست شدن بعد از ۲۰ دقیقه (BU)	درجه سست شدن بعد از ۱۰ دقیقه (BU)	ارزش والوریمتری
قوی	۶۰/۶	۴	۴/۳۰	۶۰	۱۱۰	۵۶
ضعیف	۵۹/۸	۲/۴۵	۳	۱۰۰	۱۵۰	۴۷

جدول ۴ - نتایج اکستنسوگرام خمیر آرد های گندم قبل از انجماد

نوع آرد	زمان (min)	انرژی ^۲ (cm)	قابلیت کشش (mm)	مقاومت به کشش (BU)	ضریب D
قوی	۴۵	۲۴	۱۳۰	۱۷۵	۱/۳۴
	۹۰	۳۳	۱۱۰	۱۶۰	۱/۴۵
	۱۳۵	۴۲	۱۰۳	۱۶۲	۱/۵۷
ضعیف	۴۵	۲۲	۱۵۰	۱۳۰	۰/۸۶
	۹۰	۲۸	۱۲۵	۱۲۰	۰/۹۶
	۱۳۵	۳۵	۱۲۵	۱۱۵	۰/۸۵

جدول ۵ - نتایج حاصل از اثر متقابل نوع آرد بر فاکتورهای اکستنسوگرام خمیر نمونه شاهد (بدون انجماد، تازه تهیه شده)

آرد قوی	آرد ضعیف
۸۲/۳۳۳ ^d	۶۷۴/۰۰۰ ^a
۸۹/۰۰۰ ^d	۶۵۱/۳۳۰ ^{ab}

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

جدول ۶ - نتایج حاصل از اثر متقابل نوع آرد و زمان نگهداری خمیر منجمد بر فاکتورهای اکستنسوگرام
خمیر منجمد (انجماد سریع)

آرد قوی	آرد ضعیف
۹۸/۰۰۰ ^c	۶۷۳/۰۰۰ ^b
۱۳۷/۶۶۷ ^b	۶۵۱/۰۰۰ ^{ab}
۱۴۶/۰۰۰ ^a	۵۴۴/۳۳۰ ^c
۱۴۰/۰۰۰ ^{ab}	۳۸۳/۳۳۰ ^d
آرد ضعیف	آرد قوی
۱۰۰/۳۳۳ ^c	۶۴۴/۳۳۰ ^b
۱۴۰/۰۳۳ ^{ab}	۶۲۶/۶۷۰ ^b
۱۴۷/۰۰۰ ^a	۳۵۱/۰۰۰ ^e
۱۴۷/۶۶۷ ^a	۳۲۴/۳۳۰ ^f

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

نوع آرد بر پوسته سطح زیرین نان، قابلیت جویدن نان و صفت بو، طعم و مزه نان ببری حاصل از خمیر منجمد اثری معنی دارد ($p < 0.05$). مقادیر آرد قوی نسبت به آرد ضعیف بیشتر است. وضعیت انجماد و مدت نگهداری خمیر در حالت انجماد، فاقد اثر معنی دار بر پارامترهای مذکور است. مقایسه جداول نشان می دهد که آرد قوی انجماد سریع و کند با آرد قوی خمیر نمونه شاهد و آرد ضعیف انجماد سریع و کند با آرد ضعیف خمیر نمونه شاهد در صفت قابلیت جویدن نان و صفت بو، طعم و مزه و در خصوصیت پوسته سطح زیرین نان آرد قوی انجماد سریع و کند با آرد قوی خمیر نمونه شاهد تفاوت معنی دار ندارند.

اثر تیمارها (نوع آرد، وضعیت انجماد و مدت نگهداری خمیر منجمد) بر ویژگی های ارگانولپتیکی نان ببری: نوع آرد و وضعیت انجماد بر صفت فرم و شکل نان و پوسته سطح فوقانی نان ببری حاصل از خمیر منجمد دارای اثر معنی دار بود ($p < 0.05$) (جدول ۷ و ۸). مقادیر برای هر دو نوع آرد انجماد سریع نسبت به انجماد کند بالاتر بود. مدت نگهداری بر صفت مذکور در هر ۴ نوع خمیر منجمد فاقد اثر معنی دار بود و مقادیر با گذشت زمان تغییر نیافت. با مقایسه جداول می توان مشاهده کرد که آرد قوی انجماد سریع با آرد قوی نمونه شاهد و آرد ضعیف انجماد کند با آرد ضعیف نمونه شاهد تفاوت معنی داری ندارند.

اثر تیمارها (نوع آرد، وضعیت انجماد و زمان نگهداری خمیر منجمد) بر بیاتی نان برابری: نوع آرد، وضعیت انجماد و مدت نگهداری خمیر منجمد فاقد اثر معنی دار برابر بیاتی نان برابری حاصل از خمیر منجمد هستند (جدول ۱۰). مقایسه جداول ۹ و ۱۰ نیز ارتباط معنی دار میان نمونه ها و شاهد نشان نمی دهنند.

نوع آرد، وضعیت انجماد و مدت نگهداری خمیر منجمد، بر صفات پوکی و تخلخل نان، سفتی و نرمی بافت و ساختار نان برابری حاصل از خمیر منجمد فاقد اثر معنی دار است. مقایسه جداول، عدم تفاوت معنی دار میان نمونه های منجمد و شاهد را نشان می دهند

**جدول ۷ - اثر نوع آرد خمیر شاهد بر ویژگی های ارگانولپتیک نان برابری تولید شده
(بدون انجماد، تازه تهیه شده)**

نوع آرد	فرم و شکل	پوسته سطح فوچانی	پوسته سطح زیرین	پوکی و تخلخل	سفتی و نرمی بافت و ساختار	قابلیت جویدن	بو، طعم و مزه
آرد قوی	^a ۴/۷۰۰	^a ۹/۶۰۰	^a ۴/۵۰۰	^a ۷/۲۰۰	^a ۱۳/۸۰	^a ۷/۶۰۰	^a ۳۴/۲۰۰
آرد ضعیف	^b ۳/۶۰۰	^b ۷/۶۰۰	^b ۳/۳۰۰	^a ۷/۲۰۰	^a ۱۳/۵۰۰	^b ۴/۴۰۰	^b ۲۴/۲۰۰

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

جدول ۸ - اثر متقابل نوع آرد، وضعیت انجماد و زمان نگهداری خمیر منجمد بر ویژگی های ارگانولپتیک نان برابری تولید شده

انجماد سریع						
آرد قوی						
فرم و شکل	پوسته سطح فوچانی	پوسته سطح زیرین	پوکی و تخلخل	سافتی و نرمی بافت و ساختار	قابلیت جویدن	بو، طعم و مزه
^a ۴/۶۰۰	^a ۹/۶۰۰	^a ۴/۴۰۰	^a ۷/۱۵۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۶۰۰	^a ۳۴/۲۰۰
^a ۴/۶۰۰	^a ۹/۴۰۰	^a ۴/۴۰۰	^a ۷/۱۵۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۴/۲۰۰
^a ۴/۵۰۰	^a ۹/۴۰۰	^a ۴/۲۰۰	^a ۷/۱۴۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۳/۳۰۰
^a ۴/۵۰۰	^a ۹/۴۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۷/۱۴۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۳/۳۰۰
آرد ضعیف						
^c ۲/۵۰۰	^c ۶/۴۰۰	^c ۳/۱۰۰	^a ۷/۱۵۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۶۰۰	^b ۲۴/۳۰۰
^c ۲/۵۰۰	^c ۶/۴۰۰	^c ۳/۱۰۰	^a ۷/۱۵۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۴۰۰	^b ۲۳/۴۰۰
^{cd} ۲/۴۰۰	^{cd} ۲/۴۰۰	^c ۳/۰۰۰	^a ۷/۱۲۰	^a ۱۳/۲۰۰	^a ۷/۴۰۰	^b ۲۳/۴۰۰
^{cd} ۲/۴۰۰	^{cd} ۲/۴۰۰	^c ۳/۰۰۰	^a ۷/۱۳۰	^a ۱۳/۲۲۰	^a ۷/۴۰۰	^b ۲۳/۴۰۰
انجماد کند						
آرد قوی						
^b ۳/۵۰۰	^b ۷/۸۰۰	^b ۴/۳۰۰	^a ۷/۱۰	^a ۱۳/۵۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۴/۲۰۰
^b ۳/۵۰۰	^b ۷/۸۰۰	^b ۴/۳۰۰	^a ۷/۱۰	^a ۱۳/۲۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۳/۳۰۰
^b ۳/۴۰۰	^b ۷/۸۰۰	^b ۴/۱۰۰	^a ۷/۰۰	^a ۱۳/۲۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۲/۴۰۰
^b ۳/۴۰۰	^b ۷/۸۰۰	^b ۷/۶۰۰	^a ۷/۰۰	^a ۱۳/۲۰۰	^a ۷/۴۰۰	^a ۳۲/۴۰۰
آرد ضعیف						
^{de} ۱/۸۰۰	^{de} ۱/۸۰۰	^d ۴/۲۰۰	^c ۳/۰۰۰	^a ۷/۱۰	^a ۱۳/۲۰۰	^b ۲۳/۴۰۰
^{de} ۱/۸۰۰	^{de} ۱/۸۰۰	^d ۴/۲۰۰	^c ۳/۱۰۰	^a ۷/۱۰	^a ۱۳/۲۰۰	^b ۲۳/۴۰۰
^e ۱/۷۰۰	^e ۱/۷۰۰	^d ۴/۲۰۰	^c ۲/۹۰۰	^a ۷/۰۰	^a ۱۲/۹۰۰	^b ۲۲/۴۰۰
^e ۱/۶۰۰	^e ۱/۶۰۰	^d ۴/۰۰۰	^c ۲/۹۰۰	^a ۷/۰۰	^a ۱۲/۹۰۰	^b ۲۲/۴۰۰

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

جدول ۹ - اثر متقابل نوع آرد و زمان نگهداری خمیر شاهد بر فاکتور بیاتی نان حاصل از خمیر نمونه شاهد (بدون انجماد، تازه تهیه شده)

چهارم	سوم	دوم	اول	زمان نگهداری
^a ۲/۹۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۴/۱۰۰	^a ۵/۰۰۰	نوع آرد
^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۴/۱۰۰	^a ۴/۸۰۰	آرد قوی
				آرد ضعیف

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

جدول ۱۰ - اثر متقابل نوع آرد، وضعیت انجماد و زمان نگهداری خمیر منجمد بر فاکتور بیاتی نان حاصل از خمیر منجمد

انجماد سریع					مدت انجماد
چهارم	سوم	دوم	اول	زمان نگهداری	
^a ۲/۷۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۴/۱۰۰	^a ۴/۹۰۰		۲۴ ساعت
^a ۲/۷۰۰	^a ۳/۲۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۸۰۰		۴۸ ساعت
^a ۲/۵۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۶۰۰		۷۲ ساعت
^a ۲/۵۰۰	^a ۳/۱۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۴۰۰		یک هفته
آرد ضعیف					
^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۸۰۰		۲۴ ساعت
^a ۲/۷۰۰	^a ۳/۳۰۰	^a ۳/۹۰۰	^a ۴/۶۰۰		۴۸ ساعت
^a ۲/۷۰۰	^a ۳/۱۵۰	^a ۳/۹۰۰	^a ۴/۶۰۰		۷۲ ساعت
^a ۲/۵۰۰	^a ۳/۱۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۴۰۰		یک هفته
انجماد کند					
آرد قوی					
^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۲۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۸۰۰		۲۴ ساعت
^a ۲/۷۰۰	^a ۲/۹۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۶۰۰		۴۸ ساعت
^a ۲/۵۰۰	^a ۲/۹۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۶۰۰		۷۲ ساعت
^a ۲/۵۰۰	^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۴۰۰		یک هفته
آرد ضعیف					
^a ۲/۷۰۰	^a ۳/۲۰۰	^a ۴/۰۰۰	^a ۴/۷۰۰		۲۴ ساعت
^a ۲/۶۰۰	^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۶۰۰		۴۸ ساعت
^a ۲/۴۰۰	^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۳۰۰		۷۲ ساعت
^a ۲/۴۰۰	^a ۲/۸۰۰	^a ۳/۸۰۰	^a ۴/۳۰۰		یک هفته

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح $\alpha = 0.05$ است.

• بحث

همکاران (۲۲) و فاضلی و همکاران (۲۳) تفاوتی معنی دار دارد.

بررسی آرد قوی و ضعیف نمونه شاهد و منجمد حاصل از انجماد سریع نشان داد که آرد قوی با توجه به پارامترهای اکستنسوگراف برای تهیه خمیر مناسب است. افزایش قابلیت

خصوصیات کلی آرد مصرفی در این مطالعه (جدول ۲) نزدیک به آردهای مصرفی در مطالعات دیگران است (۲۳-۲۰).

مشخصات فارینوگراف و اکتنسوگراف آرد مصرفی در این بررسی با تحقیقات انجام گرفته توسط برنجی ارdestانی و

منجمد بهتر است (۲۶، ۲۷). مقادیر ویژگی‌های ارگانولپتیکی نان حاصل از انجماد سریع از انجماد کند در تمامی نمونه‌ها بالاتر است. علت حفظ پیوستگی بافت شبکه گلوتونی، در نتیجه تشکیل کریستال‌های ریز یخ است. همچنین مقادیر بهدست آمده برای نان حاصل از خمیر منجمد آرد قوی انجماد سریع نسبت به نوع ضعیف بالاتر و به نان خمیر نمونه شاهد نزدیک‌تر است. بررسی حاضر نشان می‌دهد که خصوصیت سفتی به جز نان حاصل از خمیر منجمد آرد قوی انجماد سریع در سایر موارد کاهش می‌یابد. مطالعه Giannou و همکارش طی هفته اول از کاهش در سفتی نان حاصل از خمیر منجمد گزارش دادند که با داده‌های این تحقیق همسویی دارد (۲۹). از طرفی Jinhee و همکارش که اثر ترکیبی انجماد و شرایط نگهداری بر خصوصیات کیفی نان حاصل از خمیر منجمد را بررسی کردند، شاهد افزایش سفتی در تمامی نمونه‌ها بودند (۸) و در مطالعه Diğri توسط Phimolsiripol و همکاران نیز افزایش سفتی در طول نگهداری ۳ ماهه مشاهده شد (۳۰). مطالعه ژنتیک‌های مختلف آرد در طول نگهداری ۱۲ هفته‌ای در صفت سفتی کاهش نشان داد (۳۱). ارزیابی حسی که کاملاً فاکتورهای پوشش بددهد و بتوان با مطالعه حاضر مقایسه کرد در منابع لاتین و فارسی یافت نشد. با این وجود، در بررسی انجام گرفته توسط کریمی و همکاران روی نان تافتون (۲۰) و مشایخ و همکاران روی نان تافتون (۳۲) ارزیابی حسی انجام شده است.

بررسی فاکتور بیاتی نشان می‌دهد که بیاتی تحت تأثیر هیچ‌کدام از عوامل در مطالعه حاضر قرار نگرفت. جهت مقایسه فاکتور بیاتی نیز منابع فارسی و لاتین در این خصوص وجود ندارد.

به‌طور کلی، یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر نشان دادند که نان ببری حاصل از خمیر منجمد (انجماد سریع) آرد قوی به نان ببری حاصل از خمیر نمونه شاهد نزدیک‌تر است و می‌تواند جایگزینی جهت کاهش عدم یکنواختی نان تولید شده، ضایعات ناشی از آماده‌سازی خمیر به‌طور سنتی و حفظ مناسب سلامت جامعه پیشنهاد شود.

کشش و کاهش در مقاومت به کشش نمونه خمیر منجمد ۲۴ ساعت (انجماد سریع) حاصل از آرد قوی با نمونه شاهد همسو است. مطالعه Inoue و همکاران از افزایش قابلیت کشش و کاهش در مقاومت به کشش در طول نگهداری گزارش داد (۲۸). این در حالی است که Jinhee و همکارش در مطالعه خود، کاهش در هر دو فاکتور را مشاهده کردند و علت را آسیب‌دیدگی شبکه گلوتونی در هنگام نگهداری به‌حالت انجماد تشخیص دادند (۸).

تحقیق حاضر نشان داد که ایجاد کریستال‌های ریز یخ، حفظ پیوستگی شبکه گلوتونی و نوع روش انجماد (سریع) نسبت به انجماد کند مناسب‌تر است و این با نتایج Jinhee و همکارش نیز همخوانی دارد (۸). همچنین نگهداری نمونه‌ها در دمای 18°C - با مطالعه Angioloni و همکاران سازگار است (۵). بررسی حاضر نشان می‌دهد که کیفیت نان تهیه شده از خمیر منجمد، به نوع آرد و درصد پروتئین آن بستگی دارد، هر چه درصد پروتئین یا گلوتن آرد بالاتر باشد، مضرات حاصل از انجماد بر روی خمیر آن کمتر خواهد بود و نان با کیفیت بهتری حاصل خواهد شد (۲۴). شبکه گلوتونی قوی برای ثبات خمیر منجمد ضروری است، زیرا خمیرهای ساخته شده از آرد قوی معمولاً مقاوم به آسیب ناشی از انجماد هستند (۱۳). Pommeranz گلوتون خمیر را برای تهیه خمیر منجمد ضروری دانست و این خواص را با استفاده از دستگاه اکستنسوگراف در سال ۱۹۷۳ مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که گندم با گلوتن قوی برای انجماد مناسب است (۲۳). Inoue و همکارانش گزارش دادند که کیفیت نان حاصل از خمیر منجمد، به‌علت کیفیت پروتئین، از آردهای گندم زمستانی، بهتر بود (۲۴). بهترین کیفیت نان حاصل از خمیر منجمد را از آردی به‌دست آورد که درصد پروتئین بالایی داشت. وی مقدار پروتئین آرد مناسب انجماد را $11 - 13\%$ براساس وزن خشک دانست (۱۶) که توسط Wolt و همکارش نیز تأیید شد (۲۶). طبق مطالعه Pommeranz روی خمیر منجمد با استفاده از دستگاه اکستنسوگراف، گندم با گلوتن قوی دارای خمیری با کشش‌پذیری بالا و مقاومت به کشش بالا بوده و خمیر آن برای انجماد مناسب است (۲۴). Wolt و همکارش اثر نوع آرد را روی مقاومت و پایداری خمیر منجمد مطالعه و پیشنهاد کردند که آرد با پروتئین بالا برای تهیه خمیر

• References

1. Study on food consumption pattern and nutrition status of Iranian families (national report, 2000-2002). National Nutrition and Food Technology Research Institute. 2004; 33. [in Persian]
2. Fakhrai F. Examination of amount and causes of bread wasting in Tehran families and bakeries. National Nutrition and Food Technology Research Institute. 1993. [in Persian]
3. Rajabzadeh N, Samiee M. Bread evolution in the world. Cereal research center. Iran. 1991. [in Persian]
4. Quail K, Master G, Wootton M. Flat bread Production. Food Australia 1991; 43 (4): 155-57.
5. Angioloni A, Balestra F, Pinnavaia G, Dalla Rosa M. Small and large deformation tests for the evaluation of frozen dough viscoelastic behavior. *J Food Eng* 2008; 87: 527-531.
6. Zhang Y, Simsek S. Physicochemical changes of starch in refrigerated dough during storage. *Journal of Carbohydrate Polymers* 2009; 78: 268-274.
7. Phimolsiripol Y, Siripatrawan U, Tulyathan V, Cleland JD. Effects of freezing and temperature fluctuations during frozen storage on frozen dough and bread quality. *J Food Eng* 2008; 84: 48-56.
8. Jinhee Yi, William L K. Combined effects of dough freezing and storage conditions on bread quality factors. *J Food Eng* 2009; 93: 495-501.
9. Bauermann O. Deep frozen dough storage conditions are critical. *Brot & Backwaren* 1994;42: (10) 10-15.
10. Baier SA, Handschin S, Von SM, Bittermann AG, Ba'chi T, Conde PB. In situ observation of the freezing process in wheat dough by confocal laser scanning microscopy (CLSM): Formation of ice and changes in the gluten network. *J Cer Sci* 2005; 42: 255-260.
11. Approved methods of analysis of the American Association of Cereal Chemists (A.A.C.C). 10th ed MN Minnesota : The American Association of Cereal Chemists. St: Paul. MN. 2000.
12. Huang W, Kim Y, Li X, Rayas DP. Rheofermentometer parameters and bread specific volume of frozen sweet dough influenced by ingredients and dough mixing temperature. *J Cer Sci* 2008; 48: 639-646.
13. Ali A, Faqir MA, Jonathan C, Allen CR, Daubert GR. Effect of modified whey protein concentrates on empirical and fundamental dynamic mechanical properties of frozen dough. *J Food Hydrocoll* 2009; 23: 1687-1692.
14. Lidyd B. Making frozen dough in an American bakery. *British Baker*. 1980;177 (18): 15-16
15. Faradi H, Finneg P, and Rubenthaler G. Functional and Compositional characteristics of Iranian flat breads. *J Food Sci*. 1982;47 (3): 226-229.
16. Marston P. Frozen dough for bread making. *Baker's Digest*. 1978;52 (5):18-20.
17. Autio K, Sandholm M. Detection of active yeast cells in frozen dough sections. *Appl Environ Microbiol*. 1992;58 (7): 2153-57.
18. Rajabzadeh N. Evaluation of Iran industrial bread. Cereal research center, Iran. 1992. [in Persian]
19. Basiri, A. Statistical Patterns in agriculture. University of Shiraz press. 1989. [in Persian]
20. Karimi M, Azizi MH, Hossaini SM. Evaluation of the staling of Taftoon bread containing sodium stearoyl lactylate (SSL) With different methods. Tarbiat Modares University. 2007;3 (3): 19-27. [in Persian]
21. Jamshidpure S, Azizi MH, Taslimi A, Hadian Z, Hossaini SM. Study of the effect of slow freezing and frozen storage on sensory characteristics of Sangak and Barbari bread. *JFST* 2009;6 (1): 65-75. [in Persian]
22. Berengi Ardestani S, Azizi MH, Sahari MA. The effect of fortification with iron, folic acid, zinc and calcium on rheology and chemical properties of Setareh wheat flour. *JFST* 2008;4 (4): 33-43. [in Persian]
23. Fazeli M, Azar M, Azizi MH. Production of fortified Barbari bread with different calcium sources and evaluation of it. *JFST* 2007;3 (4): 33-40. [in Persian]
24. Pomeranz Y. Industrial uses of cereals. American Association of Cereal Chemistry. 1973: 41-49.
25. Inoue Y, Bushuk W. Studies on frozen dough. *Cereal Chemistry*. 1992;69 (4): 423-28.
26. Wolt M, Dappolonia B. Factors involved in stability of dough. *Cereal Chemistry*. 1984;61 (3): 209-12.
27. Wolt M, Dappolonia B. Factors involved in stability of frozen dough. *Cereal Chemistry*. 1984;61 (3): 213-21.
28. Inoue Y, Sapirstein H, Takayanagis. Studies on frozen dough. *Cereal Chemistry*. 1994;71 (3): 118-21.
29. Giannou V, Tzia C. Frozen dough bread: Quality and textural behavior during prolonged storage – Prediction of final product characteristics. *J Food Eng* 2007;79: 929-934.
30. Phimolsiripol Y, Siripatrawan U, Tulyathan V, Donald J. Cleland. Effects of freezing and temperature fluctuations during frozen storage on frozen dough and bread quality. *J Food Eng* 2008;84: 48-5.
31. Bhattacharya M, Langstaff TM, Berzonsky WA. Effect of frozen storage and freeze-thaw cycles on the rheological and baking properties of frozen doughs. *J Food Res Int* 2003;36: 365-372.
32. Mashayekh M, Mahmoodi MR, Entezari MH. The effects of flour fortification with defatted soy flour on the organic and biological properties of Taftoon bread. *JFST* 2007;2 (3): 73-80. [in Persian].

Effects of flour type, freezing method, and storage time on the quality of *Barbari* bread made from frozen dough

Koushki MR^{*1}, Khoshgozaran Abras S², Azizi MH³

1- *Corresponding author: Assistant Prof (in Research), Dept. of Food Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Email: mr_koushki@yahoo.com

2- M.Sc Student in Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3- Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Received 8 Mar, 2010

Accepted 4 Jul, 2010

Background and Objectives: Studies show that huge amounts of bread are wasted in our country. One reason for this is the dough preparation process. The objective of this study was to explore the possibility of making bread from frozen dough to reduce bread wastage.

Materials and Methods: Dough was prepared by the all-in method and frozen at -30°C to -35°C (fast freezing) or -18°C to -20°C (home freezer, slow freezing). The frozen doughs were packed in two-layer polyethylene bags and stored at -18°C, defrosted after 24h, 48h, 72 h, and one week storage, and tested for extensographic characteristics. *Barbari* bread (a type of Iranian flat bread) was then made from the thawed dough samples and, after sensory evaluation, was stored for 1-4 d in two-layer polyethylene bags at ambient temperature, in order to do staling tests.

Results: Storage time significantly affected extensibility, resistance and the coefficient D ($p<0.05$). The type of flour had no significant effect on extensibility, resistance, or energy changes. Sensory evaluation showed that shape and upper crust surface of the *Barbari* bread was significantly affected by the freezing method and flour type ($p<0.05$). The data also showed that the lower crust surface, chewiness, aroma, and taste of the bread were statistically significantly associated with the flour type. The flour type, freezing method, and storage time had no significant effects on porosity, firmness, or staling.

Conclusion: Fast-frozen dough prepared from strong flour can be an appropriate alternative for fresh dough for making *Barbari* bread.

Keywords: Frozen dough, Extensograph, Farinograph, *Barbari* bread, Sensory evaluation, Staling