

تأثیر باکتریوسین Z روی زمان ماندگاری فیله کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال

محسن اصغری^۱، ابراهیم علیزاده دوغیکلابی^۲، رضا صفری^۳، علی ارشدی^۴

۱- دانشآموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه زابل

۲- نویسنده مسئول: استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل پست الکترونیکی: ebi_alizadeh2003@yahoo.com

۳- مریم گژوهشی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مازندران

۴- مریم گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

تاریخ پذیرش: ۹۰/۲/۶

تاریخ دریافت: ۸۹/۸/۵

چکیده

سابقه و هدف: قابلیت فساد پذیری بالای ماهیان سبب شده تا حفظ کیفیت ماهی تازه، یکی از مسائل مهم برای صنعت فراوری ماهی و مصرف کنندگان باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر ضدباکتریایی و ضداسیدانی باکتریوسین Z روی فیله کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال بود.

مواد و روش‌ها: فیله‌های ماهی پس از توزین با استفاده از نایسین Z (۰/۰ گرم به ازای هر کیلوگرم) اسپری شدند. سپس در شرایط خلاً بسته‌بندی و در یخچال (۴°C) نگهداری شدند. شاخص‌های میکروبی (LAB, PTC, TVC, TBA, PV) و شیمیایی (TVB-N) در روزهای ۳، ۶ و ۹ اندازه‌گیری شدند.

یافته‌ها: میزان باکتری‌های سرمادوست، اسید لاکتیک و هوایی مزوپیل در نمونه‌های شاهد، بالاتر از تیمار حاوی نایسین بود. شاخص‌های میکروبی در تیمارهای دارای باکتریوسین به طور قابل توجهی در آغاز دوره کاهش یافت و از آن پس با سرعت رشد کمتری نسبت به نمونه‌های شاهد افزایش یافت. شاخص‌های شیمیایی در تیمارهای حاوی نایسین نسبت به تیمار شاهد با شبی کمتری افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: استفاده از متاپولیت‌ها به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در فیله ماهیان به ویژه جهت افزایش زمان ماندگاری فیله‌ها هنگام نگهداری در یخچال می‌تواند موثر باشد. استفاده از نایسین Z سبب افزایش زمان ماندگاری فیله کپور نقره‌ای به مدت ۳ روز در دمای ۴°C شد.

واژگان کلیدی: باکتریوسین Z، زمان ماندگاری، کپور نقره‌ای، شاخص‌های شیمیایی، شاخص‌های میکروبی

• مقدمه

فروش به کار می‌رود. نگهداری ماهی در یخچال سبب کاهش سرعت فعالیت‌های آنزیمی و شیمیایی و فعالیت موجودات ذره‌بینی می‌شود، اما به دلیل عدم توانایی دمای یخچال (۴°C) برای کاهش دمای ماهی به مقدار لازم، تغییرات نامطلوبی از جمله اکسیداسیون و هیدرولیز چربی به آرامی صورت می‌گیرد و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد (۲، ۳). بنابراین، استفاده از موادی مناسب با فعالیت ضدباکتریایی و ضداسیدانی به منظور بهبود کیفیت، افزایش زمان ماندگاری گوشت و در عین حال جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد (۴).

یکی از راههای رسیدن کشورهای در حال توسعه به اهداف تغذیه‌ای، آبزی پروری است. در پرورش چند گونه Hypophthalmichthys molitrix (molitrix) به دلیل استفاده از قاعده اول هرم غذایی (فیتوپلانکتون‌ها)، رشد سریع، مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زا، استرس و شرایط دشوار حمل و نقل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۱). آبزیان به دلیل داشتن پروتئین نسبتاً بالا، ترکیبات ازت دار و چربی‌های غیرنشایع فراوان در عضلات یکی فساد پذیرترین مواد غذایی محسوب می‌شوند. نگهداری در یخچال از روش‌هایی است که در مراکز عرضه ماهی یا جهت انتقال ماهی از مراکز پرورش تا مراکز

باکتریوسین Z روی افزایش زمان ماندگاری فیله کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال (4°C) ارزیابی شد.

• مواد و روش‌ها

تهیه ماهی: ۱۵ عدد ماهی فیتوفاغ با وزن متوسط $800 - 700$ گرم از یکی از استخراهای پرورش ماهی واقع در شهرستان بابل تهیه و در کنار بیخ به پژوهشکده اکولوژی دریایی خزر واقع در شهر ساری منتقل شد. ابتدا ماهیان شسته و سپس فیله‌ها ($5\text{cm} \times 8\text{cm}$) تهیه شدند. تعدادی از فیله ماهیان، توزین (۵۰ gr) و نایسین Z با غلظت 0.2% گرم به ازای هر کیلوگرم روی آن‌ها اسپری شد. نمونه‌های حاوی نایسین و نمونه‌های شاهد به صورت جداگانه با استفاده از دستگاه وکیوم (BOSS N84) در شرایط خلاً بسته‌بندی (۲۴) بسته و در یخچال (4°C) نگهداری شدند. شاخص‌های شیمیایی و میکروبی در روزهای صفر، ۳، ۶ و ۹ مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمایش‌ها با ۲ تیمار و ۳ تکرار انجام شدند.

شاخص‌های شیمیایی: برای اندازه‌گیری pH مقدار ۵ گرم از هر نمونه با 45ml آب مقطر در یک همزن به مدت 30 ثانیه به خوبی مخلوط شدند (۱۸). pH نمونه‌ها با pH متر ۴ دیجیتالی (Multiline P4 Wtw) با استانداردهایی در 4 و 7 اندازه‌گیری شد. عدد پراکسید (Peroxide value) طبق روش Egan و همکاران (۱۹)، مجموع بازهای نیتروژنی فرار AOAC (Total Volatile Basic Nitrogen) به روش (۲۰) و تیوباربیتوریک اسید (Thiobarbituric acid) طبق روش Namulema و همکاران (۲۱) در کل دوره اندازه‌گیری شدند.

آنالیزهای میکروبی: 10 گرم از گوشت ماهی با 90ml سرمه فیزیولوژی (NaCl 0.85%) در یک همزن به مدت 60 ثانیه به خوبی مخلوط شدند. در صورت نیاز (بالا بودن تعداد باکتری‌ها در یک پلیت) رقیق‌سازی نمونه‌ها (تا رقت نهایی) در محلول سرمه فیزیولوژی انجام شد.

پلیت‌های کشت داده شده مربوط به شمارش باکتری‌های هوایی مزوپلیت بعد از 48 ساعت گرمخانه‌گذاری در دمای 35°C (۱۹) و پلیت‌های مربوط به باکتری‌های سرما‌مودوست بعد از 10 روز گرمخانه‌گذاری در دمای 4°C شمارش شدند (۲۲). برای شمارش باکتری‌های اسید لاتکتیک (Agar DeMan Rogosa and Sharpe) استفاده کشت MRS (۲۳) شد. نمونه‌های اخیر در ظرف بی هوایی گازپک C قرار داده شده و در انکوباتور 30°C به مدت 2 تا 3 روز نگهداری

در سال‌های اخیر به علت استقبال کمتر مصرف کنندگان از مواد غذایی فراوری شده با مواد شیمیایی، استفاده از مواد نگهدارنده بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است (۵). باکتریوسین‌ها از باکتری‌های اسید لاتکتیک (Lactic Acid) (Bacteria) از جمله لاکتوکوکوس (Lactococcus)، لاکتوباسیلوس (Lactobacillus)، پیدیوکوکوس (Pediococcus) تولید می‌شوند. نایسین پپتید با 34 اسید آمینه از گروه A لنتی‌بیوتیک‌ها (Lantibiotics) است و از باکتری‌های لاکتوکوکوس لاکتیس تولید می‌شود و در مقابل باکتری‌های گرم مثبت مانند لیستریا منوسیتوفیزنز و باکتری‌های تولید کننده اسپور مثل گونه‌های باسیلوس و کلستریدیوم اثر باکتری‌کشی (bactericide) دارد (۶). نایسین اولین بار توسط Rogerz در سال ۱۹۲۸ (به نقل از Harris) برای جلوگیری از رشد لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (Lactococcus bulgaricus) به کار رفت (۷). ولی به علت فعالیت کم ضدمیکروبی، حلایلت کم در مایعات بدن، تجزیه توسط پروتئازهای دستگاه گوارش و عدم پایداری آن در pH فیزیولوژیک برای اهداف کلینیکی نامناسب بود (۸) و تا سال ۱۹۴۰ نایسین مورد توجه قرار نگرفت (۷).

کلستریدیوم جلوگیری می‌کند (۷). سرانجام، این ماده با نام تجاری نیزابلین (Nisaplin) در انگلستان توسط آپلین و WHO و FAO پارت تولید شد و در سال ۱۹۶۹ دو سازمان ۱۹۶۹ به عنوان نگهدارنده مواد غذایی به جای مواد شیمیایی تأیید کردند (۸). بنابراین، نایسین از سال ۱۹۸۷ به عنوان ماده افزودنی مجاز در مواد غذایی و در محصولات لبنی استفاده شده است. امروزه، نایسین به عنوان یک ماده نگهدارنده در بیش از 50 کشور در سراسر دنیا در محصولات متنوع مثل پنیر، غذاهای کنسرво شده و محصولات گوشتی استفاده می‌شود (۹-۱۴).

دو نوع نایسین (نایسین A و نایسین Z) در میان سویه‌های تولید کننده نایسین شناخته شده است. این دو به وسیله جایگزینی اسید آمینه شماره ۲۷ که با هیستیدین به نایسین A و با آسپاراژین تبدیل به نایسین Z تبدیل می‌شود، شناخته می‌شوند (۱۵). این تغییر ساختمنی به نایسین Z حلایلت و قابلیت پخش بالا می‌دهد که برای استفاده‌های غذایی می‌تواند مفید واقع شود (۱۶). در حال حاضر، استفاده از باکتری‌های اسید لاتکتیک و متabolیت‌های آن‌ها به عنوان نگهدارنده طبیعی متدائل است (۱۷). در این تحقیق، کارایی

جدول ۲- تغییرات مقادیر PV (میلی اکی والان ۲) در کیلو گرم چربی ماهی) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

Z باکتریوسین	شاهد	روز
۰/۴۴±۰/۰ ۱ Ba	۰/۴۸±۰/۰ ۱ Aa	.
۱/۹۷±۰/۱۲ Bb	۳/۸۴±۰/۲ Ab	۳
۶/۱۸±۰/۲۳ Bc	۸/۶۱±۰/۵ Ac	۶
۸/۵±۰/۲۳ Bd	۱۱/۶۲±۰/۳ Ad	۹

داده‌های جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی دار در زمان‌های مختلف است.

مقادیر TBA: تغییرات میزان TBA برای تیمار شاهد افزایش یافت (جدول ۳). به طوری که این روند در کل دوره برای نمونه شاهد، معنی دار ($P < 0.05$) بود. ولی در تیمار حاوی باکتریوسین تغییری تا روز ۳ مشاهده نشد و بعد از آن افزایش یافت.

جدول ۳- تغییرات مقادیر TBA (میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

Z باکتریوسین	شاهد	روز
۰/۰۹±۰/۰۰ Aa	۰/۱±۰/۰۰ Aa	.
۰/۱±۰/۰۰ Ba	۰/۲۹±۰/۰۰ Ab	۳
۰/۲۴±۰/۰ ۱ Bb	۰/۵۲±۰/۰۰ Ac	۶
۰/۳۱±۰/۰۰ Bc	۰/۷۶±۰/۰ ۱ Ad	۹

داده‌های جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی دار در زمان‌های مختلف است.

مقادیر TVB-N : تغییرات TVB-N ماهی فیتوفاگ در زمان‌ها و تیمارهای مختلف در جدول ۴ نشان داده شده است. مقدار TVB-N طی ۹ روز نگهداری در هر دو تیمار افزایش معنی داری را نشان داد ($P < 0.05$). به طوری که دامنه تغییرات این شاخص در تیمارهای شاهد، بیش از ماهیان تیمار شده با باکتریوسین بود.

شدند (۲۳). پس از اتمام زمان گرمخانه‌گذاری، کلنی‌ها پس از شمارش در عکس رقت مورد استفاده ضرب و بر وزن نمونه برداشته شده تقسیم شد. سپس لگاریتم آن‌ها گرفته شد تا لگاریتم تعداد کلنی در واحد وزن (log cfu/g) به دست آید.

تجزیه و تحلیل آماری: برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از دو تیمار از آنالیز واریانس دو طرفه (ANOVA) و برای بررسی تفاوت‌های بین میانگین‌ها در زمان‌های مختلف برای یک تیمار و بین دو تیمار در یک زمان از آزمون LSD استفاده شد. برای انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS₁₅ استفاده شد.

۰ یافته‌ها

شاخص‌های شیمیابی

مقادیر pH: در طول دوره نگهداری pH فیله حاوی باکتریوسین بجز در روز صفر اختلاف معنی داری ($P < 0.05$) را با نمونه شاهد نشان داد (جدول ۱). مقادیر آن در تیمار حاوی باکتریوسین به آرامی کاهش یافت. این روند بعد از ۶ روز به خوبی قابل مشاهده بود، به طوری که به کمترین مقدار خود در روز ۹ رسید.

جدول ۱- تغییرات مقادیر pH در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

Z باکتریوسین	شاهد	روز
۶/۵۲±۰/۰ ۳ Aa	۶/۶±۰/۰ ۷ Aa	.
۶/۴۵±۰/۰ ۷ Ba	۶/۶±۰/۰ ۶ Aa	۳
۶/۳۱±۰/۰ ۵ Bb	۶/۵۵±۰/۰ ۵ Aa	۶
۶/۱۱±۰/۰ ۴ Bc	۶/۵۰±۰/۰ ۸ Aa	۹

داده‌های جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی دار در زمان‌های مختلف است.

مقادیر PV: مقادیر PV در این آزمایش، روند صعودی داشت. این روند در تیمار شاهد بیشتر از تیمار حاوی باکتریوسین بود. بین این دو تیمار در زمان‌های مختلف اختلاف معنی داری ($P < 0.05$) مشاهده شد (جدول ۲).

تأثیر باکتریوسین Z ... / محسن اصغری و همکاران

جدول ۶- تغییرات مقادیر PTC (log CFU/g) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

باکتریوسین Z	شاهد	روز
۴/۶۸±۰/۰۳ ^{Ba}	۵/۵۷±۰/۱۹ ^{Aa}	۰
۵/۶±۰/۰۴ ^{Bb}	۶/۴۲±۰/۱۱ ^{Ab}	۳
۶/۸۴±۰/۰۵ ^{Bc}	۸/۶۸±۰/۰۶ ^{Ac}	۶
۸/۵۵±۰/۰۵ ^{Bd}	۱۰/۴۳±۰/۰۶ ^{Ad}	۹

داده‌های جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در زمان‌های مختلف است.

باکتری‌های اسید لاكتیک (LAB): تفاوت معنی‌داری (P<۰/۰۵) بین باکتری‌های اسید لاكتیک نمونه‌های شاهد و تیمارهای باکتریوسین دار در زمان‌های مختلف وجود دارد (جدول ۷). به طوری که مقدار آن در تیمار حاوی باکتریوسین پایین تر از نمونه‌های شاهد است.

جدول ۷- تغییرات مقادیر LAB (log CFU/g) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

باکتریوسین Z	شاهد	روز
۳/۱۷±۰/۱۷ ^{Ba}	۳/۸۱±۰/۰۷ ^{Aa}	۰
۳/۶۵±۰/۰۴ ^{Bb}	۴/۱±۰/۰۸ ^{Ab}	۳
۴/۶۳±۰/۰۵ ^{Bc}	۵/۴۵±۰/۲۵ ^{Ac}	۶
۵/۸۹±۰/۰۵ ^{Bd}	۷/۷۳±۰/۰۵ ^{Ad}	۹

داده‌ای جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در زمان‌های مختلف است.

• بحث

اسپری یا غوطه‌ور کردن محصولات گوشت خام در محلول‌های ضدبакتریایی قبل از بسته‌بندی می‌تواند روش مناسبی برای جلوگیری از رشد پاتوژن‌های عامل فساد باشد (۲۴، ۲۵). بیشترین رشد پاتوژن‌های عامل فساد در

جدول ۴- تغییرات مقادیر TVB-N (میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم گوشت ماهی) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

باکتریوسین Z	شاهد	روز
۱۶/۳۸±۰/۹۹ ^{Ba}	۱۸/۶۲±۰/۴۶ ^{Aa}	۰
۲۲/۷۱±۰/۷ ^{Bb}	۲۵/۹۸±۰/۶۸ ^{Ab}	۳
۲۷/۶۵±۰/۹۳ ^{Bc}	۴۲/۱۸±۱/۳۹ ^{Ac}	۶
۳۴/۶۴±۰/۹۹ ^{Bd}	۵۳/۸۳±۱/۸۶ ^{Ad}	۹

داده‌ای جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (c) (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در زمان‌های مختلف است.

شاخص‌های میکروبی

باکتری‌های هوازی مزووفیل (TVC) : جدول ۵ اثر باکتریوسین بر TVC را در زمان‌های مختلف نگهداری برای فیله ماهی فیتوفاگ نشان می‌دهد. میزان TVC طی زمان نگهداری در همه تیمارها روند صعودی داشت، ولی تغییرات این روند در تیمارهای شاهد بیشتر از تیمار حاوی باکتریوسین بود.

جدول ۵- تغییرات مقادیر TVC (log CFU/g) در زمان‌ها و تیمارهای مختلف

باکتریوسین Z	شاهد	روز
۴/۸۵±۰/۰۳ ^{Ba}	۵/۸۳±۰/۰۸ ^{Aa}	۰
۵/۸۸±۰/۰۳ ^{Bb}	۶/۶۷±۰/۰۶ ^{Ab}	۳
۶/۹۳±۰/۰۳ ^{Bc}	۸/۸۲±۰/۰۲ ^{Ac}	۶
۸/۸۷±۰/۰۵ ^{Bd}	۱۰/۷۸±۰/۰۷ ^{Ad}	۹

داده‌ای جدول‌ها شامل میانگین ± انحراف معیار است.

حروف بزرگ مشترک (A, B) در هر سطر نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در دو تیمار است.

حروف کوچک مشترک (a, b, c) (a, b, c) در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی‌دار در زمان‌های مختلف است.

باکتری‌های سرمادوست (PTC): جمعیت این دسته از باکتری‌ها طی دوره نگهداری در هر دو تیمار به شکل قابل توجهی افزایش یافت (جدول ۶). به طوری که این میزان در تیمارهای شاهد بیشتر از تیمارهای باکتریوسین طی نگهداری در دمای یخچال می‌باشد.

استاندارد تعیین شده ($mg\text{ در }g^{-1}$) بود (۳۲)، (۳۱). به نظر می‌رسد که باکتریوسین‌ها با کاهش pH و بار میکروبی، موجب تجزیه کمتر پروتئین‌ها توسط میکرووارگانیسم‌ها می‌شود و بر TVB-N نمونه‌ها نیز مؤثر است (۳۳).

در مطالعه حاضر میزان TVC ابتدایی در تیمارهای شاهد و حاوی باکتریوسین به ترتیب برابر با $5/83$ و $4/85$ بود که در انتهای دوره به $10/78$ و $8/87$ رسید. شمارش باکتری‌های هوایی مزو菲尔 نمونه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از نمونه باکتریوسین دار بود که نشان دهنده اثرات بازدارندگی باکتریوسین بر باکتری‌های هوایی مزو菲尔 است. باکتری‌های سرمادوست گرم منفی، میکرووارگانیسم‌های اصلی مسئول فساد ماهی تازه نگهداری شده به صورت سرد هستند (۲۹) و بیشترین حد پیشنهاد شده برای باکتری‌های سرمادوست $\log CFU/g$ است (۳۴). نمونه‌های شاهد پس از ۹ روز نگهداری از $5/57$ به $10/43 \log CFU/g$ رسیدند تعداد این باکتری‌ها در نمونه‌های تیمار شده با باکتریوسین در ابتدای دوره $4/68$ بود و در انتهای دوره به $8/55$ رسید که به طور معنی‌داری کمتر از نمونه شاهد بود. بالا بودن مقادیر PTC در ابتدای دوره احتمالاً به دلیل گونه ماهی و همچنین دستکاری‌های صورت گرفته در حین تخلیه شکمی و فیله کردن است.

میزان باکتری‌های اسید لاكتیک در نمونه‌های شاهد در ابتدای دوره $3/81 \log CFU/g$ بود که در انتهای دوره به $7/73 \log CFU/g$ رسید. در تیمارهای حاوی باکتریوسین از $3/17 \log CFU/g$ در ابتدای دوره به $5/89 \log CFU/g$ در انتهای دوره رسید. باکتری‌های اسید لاكتیک، جزء باکتری‌های گرم مثبت محسوب می‌شوند و از آنجا که بیشترین تأثیر باکتریوسین بر باکتری‌های گرم مثبت است (۱۷) این ترکیب باعث تفاوت معنی‌داری بین میزان باکتری‌های اسید لاكتیک ماهیان حاوی باکتریوسین و نمونه‌های شاهد شد (۳۵). نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که PV، TVB-N از شاخص‌های شیمیایی و TVC از شاخص‌های میکروبی مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فساد هستند و باکتریوسین Z می‌تواند زمان ماندگاری فیله کپور نقره‌ای نگهداری شده در یخچال (4°C) را از 3 به 6 روز افزایش دهد.

استفاده از متابولیت‌های باکتریایی به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در فیله ماهیان، به ویژه برای افزایش زمان ماندگاری

نمونه‌های شاهد اتفاق افتاد که با نتایج مطالعات گذشته مطابقت داشت (۲۵-۲۸). تجزیه ترکیبات نیتروژنی در طول نگهداری ماهی به افزایش pH گوشت منجر می‌شود که بخشی از این افزایش ممکن است با تولید ترکیبات قلبایی مرتبط باشد. چنین افزایشی در pH می‌تواند نشانگر رشد باکتری‌ها، کاهش کیفیت و در نهایت، فساد ماهی باشد (۲۹).

در تحقیق حاضر، احتمالاً کاهش pH به دلیل تأثیر نایسین بر ترکیبات نیتروژنی فرار بوده است (۳۰). مقدار PV در مراحل اولیه نگهداری کم بود. این مرحله که دوره "اکسیداسیون کند" نام دارد، تحت اثر برخی ترکیبات سلولی است که در بافت‌هایی مانند عضلات ماهی وجود دارد و با دادن الکترون به عنوان بازدارنده‌های اکسیداسیون مراحل آغازی و انتشار عمل می‌کنند. این ترکیبات، عمر محدودی دارند و سرانجام اکسید می‌شوند. هنگامی که این مسئله رخ می‌دهد، دوره کند اکسیداسیون پایان می‌یابد و به دنبال این مرحله، افزایش سریع پراکسید مشاهده می‌شود (۲۷). اما دوباره با افزایش زمان نگهداری، مقادیر پراکسید کاهش می‌یابد که در مطالعه حاضر چنین کاهشی مشاهده نشد. افزایش مقادیر PV برای فیله‌های ماهی کپور نقره‌ای تیمار شده با باکتریوسین و مقایسه آن با نمونه‌های روز اول، نشانه توسعه فساد و تندی در هنگام نگهداری ماهیان بود.

افزایش مقادیر TBA می‌تواند به علت تشکیل محصولات ثانویه هیدرولیز چربی‌ها طی زمان نگهداری باشد (۲۸). از آنجا که TBA همانند پراکسید محصول اکسیداسیون چربی است، باکتریوسین با کاهش باکتری‌های لیپولتیک باعث می‌شود تا میزان این شاخص در محصولات باکتریوسین دار در مقایسه با تیمارهای شاهد در طول دوره نگهداری در دمای یخچال کمتر باشد. نبود اکسیژن ملکولی در تیمارهای وکیوم شده تا حد زیادی باعث کاهش اکسیداسیون لیپید و درنتیجه کاهش TBA در تیمارها می‌شود. مقادیر PV و TBA در ماهیان تیمار شده با باکتریوسین به طور معنی‌داری کمتر از نمونه‌های شاهد بود که به دلیل خصوصیات آنتیاکسیدانی باکتریوسین‌ها و اثر ضد میکروبی آن بر واکنش‌های آنزیمی باکتریایی مرتبط با اکسیداسیون چربی در ماهیان است. افزایش مقادیر TVB-N احتمالاً به علت فعالیت باکتری‌ها طی مدت زمان نگهداری در دمای یخچال بود (۳۰). نتایج به دست آمده در این تحقیق در تیمار دارای باکتریوسین در روز ۹ نگهداری برابر حد

استفاده شود تا از ایجاد مقاومت در باکتری‌ها جلوگیری کند. یا از غلظت‌های کمتر آن همراه با سایر مواد نگهدارنده استفاده شود.

فیله‌ها هنگام نگهداری در یخچال می‌تواند مؤثر باشد. نایسین برای کنترل رشد برخی میکروارگانیسم‌های مولد فساد کارایی دارد. اما بهتر است از غلظت ۰/۲ گرم به ازای یک کیلوگرم

• References

- Siddaiah D, Vidya SRG, Raju CV, Chandrasekhar TC. Changes in lipids, proteins and kamaboko forming ability of silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) mince during frozen storage. *Food Res Int* 2001; 34 (1): 47-53.
- Rezaei M, Sahari MA, Moeini S, Safari M, Ghaffari F. Comparison quality oil of anchovy Kilka in two methods of transport and cold storage. *Iranian J of Fisheries Sci* 2003; 3: 97-108 [in persian].
- Pérez-Alonso F, Arias C, Aubourg SP. Lipid deterioration during chilled storage of Atlantic pomfret (*Brama brama*). *Eur J Lipid Sci Techno* 2003; 105: 661-7.
- Yin MC, Cheng WS. Antioxidant and antimicrobial effects of four garlic driven organosulfur compounds in ground beef. *Meat sci* 2003; 63: 23-8.
- Chen H, Hoover DG. Bacteriocins and their food application. *Comprehensive Reviews Food Sci and Food Saf* 2003; 2: 82-100.
- Pol IE, Smid EJ. Combined action of nisin and carvacrol on *Bacillus cereus* and *Listeria monocytogenes*. *Lett Appl Microbiol* 1999; 29: 166-70.
- Harris LJ, Fleming HG. Development in nisin research. *Food Res Int* 1992; 25: 57-66.
- Broughton JD. Nisin and its uses as a food Preservative. *Food Techno* 1990; 100-12.
- De Martinis ECP, Crandall AD, Mazzotta AS, Montville TJ. Influence of pH, salt and temperature on nisin resistance in *Listeria monocytogenes*. *J of Food Protection* 1997; 60: 420-3.
- Martirani L, Varcamonti M, Naclerio G, Felice M. Purification and partial characterization of bacillocin 490, a novel bacteriocin produced by a thermophilic *Bacillus licheniformis*. *Microb Cell Fact* 2002; 1: 1-5.
- Morgan SM, Galvin M, Kelly J, Ross RP, Hill C. Development of a lacticin 3147-enriched whey powder with inhibitory activity against foodborne pathogens. *J of Food Protection* 1999; 62: 1011-16.
- Noonpakdee W, Snativarangekna C, Jumriangrit P, Sonomot K, Panyim S. Isolation of nisin-producing *Lactococcus lactis* WNC 20 strain from nham, a traditional Thai fermented sausage. *Int J Food Microbiol* 2003; 81: 137-45.
- Olasupo NA, Schillinger U, Narbad A, Dodd H, Holzapfel WH. Occurrence of nisin z production in *Lactococcus lactis* BFE 1500 isolated from wara, a traditional Nigerian cheese product. *Int J Food Microbiol* 1999; 53 (2-3): 141-52.
- Soomro AH, Masud T, Anwaar K. Role of lactic acid bacteria (LAB) in food preservation and human health. *Pakistan J Nutr* 2002; 1: 20-4.
- Mulders JW, Boerrigter IJ, Rollema HS, Siezen RJ, De Vos WM. Identification and characterization of the lantibiotic nisin Z, a natural nisin variant. *Eur J Biochem* 1991; 201(3): 581-4.
- De Vos WM, Mulders JW, Siezen RJ, Hugenholtz J, Kuipers OP. Properties of nisin Z and distribution of its gene, *nizZ*, in *Lactococcus lactis*. *Appl Environ Microbiol* 1993; 59: 213-18.
- Jeevaratnam K, Jamuna M, Bawa A S. Biological preservation of foods-Bacteriocins of lactic acid bacteria. *Indian J of Biotechno* 2005; 4: 446-54.
- Sallam KI, Samejima K. Microbiological and chemical quality of ground beef treated with sodium lactate and sodium chloride during refrigerated storage. *LWT- Food Sci Techno* 2004; 37(8): 865-71.
- Egan H, Kirk RS, Sawyer TR. Parsons chemical analysis of foods .9 th ed.Churchill Livingstone. Edinburgh, UK; 1997.p. 609-34.
- Association of Official Analytical Chemists. *Official Methods of Analysis of the Association of the Official Analysis Chemists*, 14th ed. Washington: AOAC; 2002.
- Namulema A, Muyonga JH, Kaaya AN. Quality deterioration in frozen Nile perch (*Lates niloticus*) stored at -13°C and -27°C. *Food Res Int* 1999; 32: 151-6.
- McMeekin TA, Olley JN, Roos T, Ratkowsky DA. Predictive microbiology: theory and application. Resaerch Studies Press Taunton, England chapter 6, section 6.1 Specified Spoilage level; 1993.p. 199-200.
- Jones R, Hussein HM, Zagorec M. Isolation of lactic acid bacteria with inhibitory activity against pathogens and spoilage organisms associated with fresh meat. *Food microbiol* 2008; 25: 228-234.

24. Palumbo SA, Williams AC. Control of *Listeria monocytogenes* on the surface of frankfurters by acid treatments. Food Microbiology 1994; 11: 293-300.
25. Samelis J, Sofos JN, Kain ML, Scanga JA, Belk KE, Smith GC. Organic acids and their salts as dipping solutions to control *Listeria monocytogenes* inoculated following processing of sliced pork bologna stored at 4°C in vacuum packages. J Food Prot 2001; 64: 1722-9.
26. Glass KA, Doyle MP. Fate of *Listeria monocytogenes* in processed meat products during refrigerated storage. Appl Environ Microbiol 1989; 55: 1565-69.
27. Hulin HO. Oxidation of lipid, In: Shahidi F, Botta JR editors. Seafood chemistry processing technology and quality. Blackie Academic Professional, Glasgow; 1994.p. 49-74.
28. Schillinger U, Geisen R, Holzapfle WH. Potential antagonistic micro-organisms and bacteriocins for the biological preservation of foods. Trends Food Sci Technol 1996; 7: 158-64.
29. Gram L, Huss HH. Microbiological spoilage of fish and fish products. I J Food Microb 1996; 3: 121- 37.
30. Ibrahim SM, Salha G. Effect of Antimicrobial Metabolites Produced by Lactic Acid Bacteria (Lab) on Quality Aspects of Frozen Tilapia (*Oreochromis niloticus*) Fillets. World J of Fish and Marine Sci 2009; 1(1): 40-5.
31. Huss HH. Quality and quality changes in fresh fish. FAO Fish Tech Pap no 348, Rome; FAO; 1995.
32. Ababouch LH, Souibri L, Rhaliby K, Ouahdi O, Battal M, Busta FF. Quality changes in sardines (*Sardina pilchardus*) stored in ice and at ambient temperature. Food Microbiol 1996; 13: 123-32.
33. Hebard CE, Flick GJ, Martin RE. Occurrence and significance of trimethylamine oxide and its derivatives in fish and shellfish. In: Martin RE., Flick GJ., Hebard CE. editors, Chemistry and biochemistry of marine food products. AVI Publishing Co, Westport, CT, USA; 1982: 149-304.
34. International Commision on Microbiological Specification for food ". Microorganisms in foods 2 Sampling for microbiological analysis: principles and specific applications.2 nd ed. Buffalo, NY: university of Toronto press; 1986.
35. Economou T, Pournis N, Ntzimani A, Savvaidis IN. Nisin-EDTA treatment and modified atmosphere packaging to increase fresh chiken meat shelf-life. Food Chem 2008; 114: 1470-6.

Effects of bacteriocine Z on the shelf-life of silver carp fillets during refrigerated storage

Asghari M¹, Alizadeh doughikollaee E^{*2}, Safari R³, Arshadi A⁴

1- M.Sc.in Fisheries, Faculty of Fisheries, University of Zabol, Iran.

2- *Corresponding author: Assistant Prof. Department of Fisheries, University of Zabol, Iran.

Email: ebi_alizadeh2003@yahoo.com

3- Lecturer, The Caspian Sea Ecology Research Center, Sari , Iran.

4- Lecturer, Department of Fisheries, University of Zabol, Iran.

Received 27 Oct, 2010

Accepted 26 Apr, 2011

Background and Objectives: Because of the high perishability of fish, keeping the quality of fresh fish is one of the most important problems in the fish-processing industry and for the consumers. The aim of this study was to determine the antibacterial and antioxidant effects of bacteriocine Z on silver carp fillets during refrigerated storage.

Materials and Methods: After being weighed, fish fillets were sprayed with nisin Z (0.2 g/kg) packaged in vacuum and refrigerated (4°C). Microbial (TVC, PTC, LAB) and chemical (PV, TBA, TVB-N) parameters were measured at days 0, 3, 6 and 9.

Results: As compared with the nisin Z-treated fish samples, the psychrotrophic, lactic-acid, and aerobic-mesophilic bacterial counts were higher in the control samples. The microbial parameters decreased significantly in the nisin Z-treated samples at the beginning of the period, followed by a slower rate of increase than the control; the chemical parameters showed a slower rate of decrease.

Conclusion: Using metabolites as natural preservatives in fish fillets may increase shelf-life of silver carp fillets during refrigerated storage. Bacteriocine Z may extend their shelf-life at 4°C by 3 days.

Keywords: Bacteriocine Z, Shelf-life, Silver carp, Chemical parameters, Microbial parameters