

## پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی رایج ژن مرتبه با توده چربی و چاقی (Fat mass and obesity associated gene) و ارتباط آن‌ها با چاقی و عوامل مرتبه با شیوه زندگی: مرور سیستماتیک

آرزو رضازاده<sup>۱</sup>

۱- نویسنده مسئول: کمیته تحقیقات دانشجویان، انتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: arezoo.rezaeae@gmail.com

### چکیده

مطالعات انجام شده در کل ژنوم انسانی نشان داده اند که ژن FTO (Fat mass and Obesity associated) بیشترین ارتباط را با چاقی دارد. ژن FTO بسیار پلی مورف (چندشکلی) است و چندین پلی مورفیسم این ژن با چاقی مرتبه است. هدف مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک بر پلی مورفیسم ژن مرتبه با چاقی و نقش تغذیه و شیوه زندگی در بروز آن است.

مقالات استفاده شده در این مطالعه، از طریق جستجو در بانک‌های اطلاعاتی pubmed، ProQuest، CINAHL، EMBASE، Medline، Scopus و پایان‌نامه‌ها و مجلات گردآوری شد. از کلید واژه‌های Fat mass and Obesity associated، FTO، Gene Polymorphism، obesity، lifestyle، physical activity، diet، energy intake محدود شد. کلیه مقالات منتشر شده دارای معیارهای ورود، در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ در وارد مطالعه شدند.

۲۸ مقاله در جستجوی سیستماتیک پایگاه‌های داده، به دست آمد که از بین آنها ۱۸ مقاله بعد از حذف خلاصه مقالات و مقالات تکراری که مرتبه با معیارهای مورد نظر ما بود انتخاب شد. درمجموع مقالات ۵ SNP (rs3751812، rs8050136، rs17817449، rs1421085، rs9939609) را بررسی کرده بودند. رابطه بین انرژی مصرفی و انرژی دریافتی با واریانت‌های ژن FTO متناقض بود. در اکثر مطالعات چربی دریافتی بالای رژیم ارتباط معنی‌داری با فراوانی آلل‌های پرخطر و چاقی داشت. رابطه آلل مینور واریانت ژنی با اضافه وزن و چاقی فقط در افراد دارای فعالیت بدنی باشد که معنی‌دار بود.

رابطه آلل پرخطر با اضافه وزن و چاقی به شدت تحت تأثیر شیوه زندگی (انرژی دریافتی، فعالیت بدنی و نوع الگوی تغذیه‌ای) قرار دارد. بنابراین تعديل الگوی شیوه زندگی می‌تواند نقش پیش‌گیرنده در افراد مستعد داشته باشد.

### واژگان کلیدی: چاقی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، ژن FTO، مرور سیستماتیک

### مقدمه

این که تخمین زده می‌شود که سهم وراثت در بروز چاقی ۶۵٪-۸۰٪ است (۹، ۱۰)، نشان داده شده است که عوامل تغذیه‌ای و عوامل محیطی نظیر فعالیت بدنی می‌توانند حساسیت ژنتیکی افراد را در بروز فنوتیپ چاقی تحت تأثیر قرار دهند (۱۱-۱۸). بنابراین، بررسی تداخل بین عوامل محیطی و ژن‌های دخیل در چاقی در طراحی برنامه‌های پیش‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. مطالعات مختلف انجام شده در کل ژنوم انسانی نشان داده‌اند که ژن FTO (Fat mass and Obesity associated gene) بیشترین

اضافه وزن و چاقی به عنوان یک عامل خطر و زمینه ساز مهم برای بسیاری از بیمارهای مزمن، از جمله دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی-عروقی محسوب می‌شود (۱). در اکثر کشورهای جهان (۲-۶)، از جمله ایران (۷) شیوع رو به افزایش اضافه وزن و چاقی به عنوان یک مشکل سلامت عمومی مطرح است. بروز و توسعه چاقی به عنوان یک مشکل چند علتی تحت تأثیر مجموعه عوامل مختلف، به ویژه عوامل اجتماعی، رفتاری، فرهنگی، اقتصادی-اجتماعی، فیزیولوژیکی، متابولیکی و ژنتیکی قرار دارد (۸). علی‌رغم

چاقی را در کودکان و چاقی مفرط در بزرگسالان در چندین مطالعه متفاوت مورد بررسی قرار دادند و در مطالعه چاقی بزرگسالان سوئیس، مطالعه چاقی کودکان و بزرگسالان فرانسوی و آلمانی فراوانی آلل مینور به طور معنی‌داری در افراد چاق بیشتر از افراد نرمال بود. در مطالعه‌ای دیگر، Price و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۳۶)، SNP‌های زن FTO مرتبط با چاقی مفرط در مطالعه مورد- شاهدی و نیز جفت‌های خواهر بسیار ناهمسان بررسی کردند. در این مطالعه، سه همکاران در سال ۲۰۱۰ (۳۷)، SNP rs1421085 و SNP rs17817449 زن FTO را در ۵۸۳ زن دارای چاقی مفرط ( $BMI < 35 \text{ kg/m}^2$ ) و ۵۴۴ زن با وزن نرمال بررسی کردند. ارتباطات معنی‌دار قوی بین چاقی و آلل‌های هر سه SNP مشاهده شد؛ اما، قوی‌ترین ارتباط با SNP rs1421085 دیده شد. یک زیر مجموعه ۹۹ نفری از گروه مورد، جفت‌های خواهر بسیار ناهمسان با  $> 25 \text{ kg/m}^2$  داشتند. جفت‌های ناهمسان از نظر فراوانی آلل‌ها و BMI داشتند. جفت‌های ناهمسان از نظر موادی با کل نمونه مورد و شاهد متفاوت ژنتیک به صورت موادی با rs17817449 دیده شد. Grant و Bozikiان در سال ۲۰۰۸ (۳۷)، رابطه SNP‌های زن FTO و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۳۷)، رابطه SNP rs1421085، rs3751812 (rs8050136، rs3751812) را با چاقی در کودکان سفید پوست و آفریقایی- آمریکایی مورد بررسی قرار دادند. ۴۱۸ کودک چاق سفید پوست (BMI $> 95\text{th percentile}$ )، ۲۲۷۰ کودک شاهد سفید پوست (BMI $> 95\text{th percentile}$ )، ۵۷۸ کودک چاق و ۱۴۲۴ کودک شاهد آفریقایی- آمریکایی بررسی کردند. با توجه به این که در مطالعه قبلی رابطه SNP rs9939609 با چاقی روی این دو قومیت به اثبات رسیده بود، این بار از rs8050136 و rs3751812 به عنوان بهترین جانشینهای rs9939609 استفاده شد (در هر دو  $r^2 = 1$ ) (Frayling و همکاران در سال ۲۰۰۷ (۳۸)). MAF: minor allele frequencies (فراآوانی آلل مینور) چاقی در هر دو نژاد به میزان معنی‌داری در گروه چاق بیشتر از گروه شاهد بود. از طرف دیگر، Jacobsson و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۳۸)، تفاوت‌های جنسیتی در ارتباط واریانت زن (rs9939609) FTO با چاقی شدید را در کودکان مورد بررسی قرار دادند. ۴۵۰ کودک شناخته شده با چاقی شدید (گروه مورد) و ۵۱۲ کودک با وزن نرمال (گروه شاهد). ارتباط واریانت زن FTO با BMI و چاقی فقط در دختران معنی‌دار بود. تفاوت‌های جنسیتی همچنین در ارتباط واریانت زن FTO با بیماری‌های مرتبط با چاقی نظیر حساسیت انسلولین و گلوکوز پلاسمای نیز دیده شد. این مطالعه پیشنهاد کرد که FTO ممکن است نقش مهمی در

ارتباط را با چاقی دارد (۱۹-۲۱). زن FTO بسیار پلی مورف (چندشکلی) است و مطالعات مورد- شاهدی نشان داده‌اند که چندین پلی مورفیسم این زن با چاقی یا فنتوپیپ‌های چاقی نظیر BMI بالا مرتبط است (۲۲-۲۷). در بین این شکال مختلف زن FTO، پلی مورفیسم نواحی (A/C) rs1421085، (T/C) rs9939609 (T/A) و (C/T) rs17817449 بیش از بقیه مطالعه شده‌اند و نیز دارای بیشترین ارتباط با فنتوپیپ چاقی هستند (۳۲-۳۴)، ۲۳، ۲۷، ۳۲-۳۴). بنابراین، هدف مطالعه حاضر مروری سیستماتیک بر پلی مورفیسم زن FTO با چاقی و نقش تغذیه و شیوه زندگی در بروز آن است.

#### یافته‌ها

۲۸ مقاله در جستجوی سیستماتیک پایگاه‌های داده، به دست آمد که از بین آن‌ها ۱۸ مقاله بعد از حذف خلاصه مقالات و مقالات تکراری که مرتبط با معیارهای مورد نظر ما بود انتخاب شد. ۸ مطالعه به صورت مقطعی، ۳ مطالعه به صورت کوهورت، ۳ مطالعه به صورت مقطعی، ۱۸ مطالعه به صورت طولی و life course analysis بود. مقاله به دست آمده به دو حیطه رابطه زن چاقی با بروز چاقی (۹ مقاله) و رابطه عوامل تغذیه، انرژی دریافتی، شیوه زندگی با بروز زن چاقی (۹ مقاله) تقسیم شدند. در مجموع، ۱۸ مقالات (SNP ۵ rs17817449، rs1421085، rs9939609) را به طور عمده بررسی کرده بودند. اما بیشترین تعداد مطالعات روی SNP rs9939609 بود.

اطلاعات برگرفته از مقالات مرور شده در بخش‌های زیر خلاصه شده است:

**رابطه پلی مورفیسم‌های زن FTO و اضافه وزن و چاقی:** Frayling و همکاران در سال ۲۰۰۷ (۳۸)، رابطه واریانت رایج زن FTO ژنتیک (rs9939609) با BMI را با تکرار در ۱۳ کوهورت دارای ۳۸۷۵۹ نفر شرکت کننده کودک و بزرگسال مورد بررسی قرار دادند. ۱۶٪ بزرگسالان که برای آلل خطر (risk allele) هموژیگوت بودند حدود ۳ کیلوگرم افزایش وزن بیشتری داشتند و ۱۶٪ برابر شانس بیشتری برای ابتلاء به چاقی نسبت به افرادی داشتند که آلل خطر را به ارث نبرده بودند. این نتایج از سن ۷ سال به بالا مشاهده شد و منعکس کننده افزایش قابل توجه در بافت چربی است. همچنین Dina و همکاران در سال ۲۰۰۷ (۳۵)، FTO (rs1421085، rs17817449) واریانت‌های زن

BMI به چاقی شدید مرتبط بودند. مخصوصاً، rs17817449 با وزن و دورکمر مرتبط بود. همچنین این SNP با انرژی مصرفی در حال استراحت (RMR) نیز مرتبط بود. همچنین، Speakman و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۴۳)، رابطه پلی Mورفیسم‌های واریانت زن (rs9939609) FTO با تغییر در دریافت انرژی و انرژی مصرفی بررسی کردند. در این مطالعه ژنتیپ ۱۵۰ مرد و زن سفیدپوست ساکن اسکاتلندر و انگلیس برای واریانت زن (rs9939609) FTO بررسی شدند و رابطه آن با انرژی مصرفی پایه (BMR) و حجم اکسیژن مصرفی حداکثر (VO<sub>2max</sub>) و دریافت انرژی بررسی شد. هیچ ارتباط معنی‌داری بین ژنتیپ FTO و BMR یا VO<sub>2max</sub> مشاهده نشد. در حالی که ژنتیپ FTO به طور معنی‌داری با تغییر در انرژی دریافتی با متوسط دریافت روزانه ۹/۰ MJ برای ژنتیپ TT (ژنتیپ بی خطر) و ۱۰/۲ و ۱۰/۹ MJ به ترتیب برای ژنتیپ‌های در خطر AT و AA مرتبط بود. تعديل دریافت انرژی با BMR تغییری در نتایج ایجاد نکرد. این مطالعه پیشنهاد کرد که ژنتیپ FTO ممکن است روی چاقی از طریق تأثیرش روی دریافت انرژی نه انرژی مصرفی اثر بگذارد. Timpson و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۱۵)، احتمال این که ممکن است اشتها در ارتباط بین FTO و BMI نقش داشته باشد را بررسی کردند. با به کار بردن اطلاعات رژیمی موجود از مطالعه طولی والدین و کودکان Avon، ارتباط بین واریانت‌های FTO با دریافت درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها بررسی کردند. نتایج نشان داد که ارتباط بین SNP rs9939609 و متغیرهای رژیمی یافت شد و می‌تواند به صورت اثر هر آلل اضافه (per-allele effects) روی کل انرژی و کل چربی خلاصه شود (p=0/001). بعد از تعديل کردن اثر BMI این ارتباط تضعیف شد ولی همچنان مخصوصاً برای مصرف چربی و انرژی دریافتی وجود داشت. این مطالعه نشان دهنده آن بود که افراد حامل واریانت‌های مینور rs9939609 چربی و انرژی بیشتری نسبت به افرادی هستند که ناقل چنین واریانت‌هایی نیستند. این مطالعه نشان دهنده آن است که این تفاوت‌ها نمی‌تواند به سادگی وابسته به داشتن میانگین BMI بالاتر باشد. از طرف دیگر در یک مطالعه طولی، Johnson و همکاران در سال ۲۰۰۹ (۴۴)، رابطه دانسته انرژی رژیمی بر بافت چربی در اوایل دوره نوجوانی و اثرات متقابل آن با واریانت FTO rs9939609 مورد بررسی قرار دادند. یک مطالعه طولی روی ۲۲۷۵ کودک شرکت کننده در مطالعه

توسعه چاقی شدید وابسته به جنس و مقاومت انسولین در کودکان داشته باشد.

Attaoua و همکاران نیز در سال ۲۰۰۹ (۳۹)، رابطه SNP rs1421085 FTO زن را با چاقی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه مورد شاهدی در فرانسه انجام شد و ۱۲۸ زن با BMI نرمال به عنوان گروه شاهد و ۱۱۹ زن با درجات مختلف چاقی و شیوع ۲۹ درصدی سندروم متابولیک وارد مطالعه شدند. زن FTO هموژیگوت (C/C) به طور معنی‌داری با هر دو نوع چاقی ساده و مفرط مرتبط بود. همچنین دو مطالعه در این زمینه در هندوستان انجام شده بود که در مطالعه اول، Taylor و همکاران در سال ۲۰۱۱ (۴۰)، رابطه واریانت زن (rs9939609) FTO را با چاقی در ۳۳۹۰ جفت خواهی و برادر هندی ساکن مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دادند که واریانت زن FTO بطور معنی‌داری با افزایش وزن و BMI مرتبط است؛ اما، با شاخص‌های دیگر تن سنجی (دور کمر، دور باسن، WHR) مرتبط نبود. در این مطالعه ارتباط بین FTO و وزن در مناطق شهری قوی‌تر از مناطق روستایی بود. اثرات زنتیک ممکن است در محیط شهری به علت شیوع بالاتر عوامل خطر چاقی قوی‌تر باشد. هرچند این مطالعه شواهدی را در زمینه اثر تعديل کننده رژیم غذایی و فعالیت بدنی گزارش نکرد و در مطالعه دوم، Mačeková و همکاران در سال ۲۰۱۲ (۴۱)، پلی مورفیسم رابطه پلی Mورفیسم ناحیه rs9939609 زن FTO را با شیوع بالای چاقی در کولی‌های هندوستان بررسی کردند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری از نظر شاخص‌های تن سنجی (BMI)، دور کمر و (WHR) در بین ژنتیپ‌های مختلف دیده شد. شاخص دور کمر در افراد دارای ژنتیپ AA، ۱/۷ سانتی‌متر بیشتر از افراد دارای ژنتیپ TT بود. هرچند، قوی‌ترین ارتباط آلل مینور A پلی Mورفیسم rs ۹۹۳۹۶۰۹ زن FTO با شاخص BMI بود (حتی بعد از تعديل کردن اثر سن، جنس و استعمال سیگار).

رابطه پلی Mورفیسم‌های زن FTO با دریافت انرژی و مصرف انرژی و شیوه زندگی: D0 و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۴۲)، ارتباط دو SNP زن FTO rs17817449 (rs1421085) را با چاقی، دریافت انرژی و مصرف انرژی در مطالعه Qubeq بررسی کردند. ژنتیپ ۹۰۸ فرد شرکت کننده در مطالعه خانواده کبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هردو SNP با فوتیپ‌های مربوط

داد که آلل‌های خطر چاقی برای واریانت رایج زن FTO ارتباطی با سطوح BMI نداشت مگر این که افراد مورد مطالعه در معرض محیط دارای عوامل خطر چاقی قرار گرفته باشند. همچنین، Lappalainen و همکاران در سال ۲۰۱۱ (۴۵)، رابطه پلی مورفیسم‌های واریانت زن (rs9939609) FTO را با انرژی دریافتی در مطالعه پیش‌گیری از دیابت فنلاند در طول ۳ سال به منظور ارزیابی این که چگونه دریافت رژیمی روی رابطه بین آلل خطر FTO و BMI اثر می‌گذارد، بررسی کردند. ۴۷۹ مرد وزن با  $\geq 25$  BMI برای rs9939609 ژنتیپ شدند. آن‌ها یادداشت غذای ۳ روزه را در شروع مطالعه و قبل از هر ملاقات سالانه پرکردند. میانگین دریافت‌ها در سال ۱، ۲ و ۳ محاسبه شد. در شروع مطالعه، واریانت FTO با مقادیر میانگین دریافت انرژی کل، درشت مغذی‌ها و فیرمر مرتبط نبود. در شروع مطالعه، BMI بالاتر به طور معنی‌داری در ژنتیپ خطر FTO گزارش شد به ویژه در افراد با میانگین  $34/5 \pm 6/2$  kg/m<sup>2</sup> و  $31/3 \pm 6/4$  BMI ترتیب برای حاملان TT، TA و AA که دریافت بالای چربی داشتند. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که ارتباط بین ژنتیپ FTO و چاقی تحت تأثیر اجزای رژیم قرار می‌گیرد. در این زمینه، در کشورهای آسیایی نیز دو مطالعه انجام شده بود. در یک مطالعه که روی افراد کره‌ای انجام گرفته بود، Lee و همکاران در سال ۲۰۱۰ (۴۶)، ارتباط ژنتیپ‌های SNP rs9939609 را با BMI و انرژی دریافتی و فعالیت بدنسازی بررسی کردند. همچنین، در یک مطالعه که روی افراد اهل ایسلاند بود، KSNP ارتباط قوی بین BMI با واریانت FTO دیده شد. همچنین بین اضافه وزن با rs9939609 نیز در هر دو گروه رابطه معنی‌دار دیده شد. اما ارتباط معنی‌دار بین rs9939609 و دریافت چربی رژیمی فقط در کودکان دیده شد. در کودکان دارای فعالیت بدنسازی کمتر، حاملان آلل A به طور معنی‌داری BMI بیشتری نسبت به حاملان TT داشتند. در بزرگسالان، یک اثر متقابل معنی‌دار rs9939609 BMI در سه سطح فعالیت بدنسازی مشاهده شد. در مطالعه دیگر روی افراد آسیایی، توسط Krasava و همکاران در سال ۲۰۱۰ (۴۷)، رابطه پلی مورفیسم rs9939609 FTO با چاقی در مطالعه روی Takahata ۲۶۳۹ زن و مرد ژاپنی با میانگین سنی ۶۳ سال بررسی شد. اثرات عوامل مرتبط با شیوه زندگی شامل

طولی AVON والدین و کودکان صورت گرفت. داده‌های رژیمی با یادداشت غذای ۳ روزه در سن ۱۰ سالگی مورد ارزیابی قرار گرفت. دانسیته انرژی رژیمی با خارج کردن نوشیدنی‌ها محاسبه شد. ژنتیپ واریانت FTO تعیین شد. در سن ۱۳ سالگی بافت چربی با روش DEXA (Prodigy Dual-energy X-ray Absorptiometry scanner) تعیین شد. هیچ شواهدی مبنی بر اثرات متقابل بین دانسیته انرژی رژیمی در ۱۰ سالگی و آلل خطر A زن FRT در رابطه با توده چربی در ۱۳ سالگی وجود نداشت نشان دهنده این بود که زن FTO هیچ اثری روی رابطه بین دانسیته انرژی رژیمی در ۱۰ سالگی و توده چربی در ۱۳ سالگی نداشت. وقتی که دانسیته انرژی رژیمی در ۱۰ سالگی و آلل A زن FTO در همان مدل بودند هر کدام بطور مستقل با توده چربی در ۱۳ سالگی مرتبط بودند. بعد از کنترل اثر گزارش دهی نادرست انرژی، جنس، فقر، وضعیت اضافه وزن در ۱۰ سالگی، تحصیلات مادر، تماسای تلویزیون و فعالیت بدنسازی، هر آلل A زن FTO با  $0.13 \pm 0.35$  کیلوگرم توده چربی بیشتر در ۱۳ سالگی و هر kj/g1 دانسیته انرژی رژیمی در ۱۰ سالگی با  $0.16 \pm 0.06$  کیلوگرم توده چربی بیشتر در ۱۳ سالگی مرتبط بود. این مطالعه نشان دهنده چندعاملی بودن FTO منشأ چاقی است و پیشنهاد می‌کند که هرچند که ممکن است بعضی کودکان را در خطر بالاتر چاقی قرار دهد، اما تشویق کردن آن‌ها به دریافت غذاهایی با دانسیته انرژی کمتر ممکن است یک استراتژی موثر برای کمک به همه کودکان به منظور جلوگیری از افزایش بافت چربی بیش از حد باشد. همچنین، در یک مطالعه کوهورت بر پایه جمعیت سالمند متولد شده در فاصله سالهای ۱۹۲۰–۱۹۲۴ (ULSAM cohort) با طول مدت ۳۲ سال پیگیری مردان، و همکاران در سال ۲۰۰۹ (۴۸)، ارتباط واریانت KSNP با BMI را با FTO زن rs9939609 ۱۱۵۳ مرد سوئدی سالمند متولد شده در فاصله سالهای ۱۹۲۰–۱۹۲۴ بررسی کردند. همچنین تأثیر فعالیت فیزیکی بر این ژنتیپ نیز بررسی شد. تعیین ژنتیپ واریانت rs9939609 FTO زن با Illumina golden gate assay در سالین ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۷۷ و ۸۲ سال بررسی شد. هیچ افزایش خطری و هیچ ارتباطی با BMI در هر سنی با واریانت FTO rs9939609 مشاهده نشد. هرچند یک اثر متقابل بین فعالیت بدنسازی در سن ۵۰ سالگی و ژنتیپ روی سطوح مشاهده شد ( $p = 0.39$ ). تفاوت‌های BMI قابل توجه بین حاملان AA و همچنین بین حاملان AT و AA در افراد با فعالیت بدنسازی کم وجود داشت. این مطالعه نشان

(A/C) rs8050136، (T/C) rs1421085، (T/A) rs3751812 و (G/T) rs17817449 شیوه زندگی (انرژی دریافتی، فعالیت بدنی و نوع الگوی تغذیه‌ای) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فراوانی آلل مینور این SNP در افراد دارای اضافه وزن و چاق به طور معنی‌داری بیشتر از افراد دارای وزن عادی بود. همچنین، در مطالعات گسترده ژنومی (T/A) rs9939609 به عنوان مؤثرترین SNP در بروز چاقی تعیین شده بود (۲۷، ۳۶، ۳۷).

همچنین تحلیل نتایج مطالعات انجام شده در مورد رابطه انرژی دریافتی، انرژی مصرفی و فعالیت بدنی با پلی‌مورفیسم‌های ژن چاقی نشان داد که رابطه بین انرژی مصرفی و انرژی دریافتی با واریانت‌های ژن FTO متفاوت است. در اکثر مطالعات، رابطه آلل مینور واریانت ژنی با اضافه وزن و چاقی فقط در افراد دارای فعالیت بدنی باشد که معنی‌دار بود (۴۵). یک مطالعه انجام شده نشان داد که آلل مینور SNP rs17817449 رابطه معنی‌داری با انرژی مصرفی داشت (۴۲). در حالی که دو مطالعه دیگر رابطه معنی‌داری بین انرژی مصرفی در حال استراحت (RMR)، انرژی مصرفی پایه (BMR) با (BMR) با (BMR) نشان ندادند (۴۳، ۴۴).

در یک مطالعه انجام شده روی rs17817449 SNP در میزان انرژی دریافتی رابطه مثبت معنی‌داری با فراوانی آلل پرخطر داشت (۴۳، ۴۵). اما در یک مطالعه دیگر چنین ارتباطی فقط در کودکان دیده شد (۱۵).

از طرف دیگر، تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه الگوی غذایی با پلی‌مورفیسم‌های ژن چاقی نشان دادند که میزان چربی دریافتی رابطه تنگاتنگی با آلل پرخطر A در SNP rs9939609 داشت. فراوانی آلل مینور در افرادی که مصرف کننده غذاهای دارای چربی بیشتری بودند، به طور معنی‌داری بیشتر از افراد دارای رژیم غذایی متعادل بودند (۴۴).

با توجه به این که نتایج مطالعات نشان داد که رابطه آلل پرخطر با اضافه وزن و چاقی به شدت تحت تأثیر شیوه زندگی (انرژی دریافتی، فعالیت بدنی و نوع الگوی تغذیه‌ای) قرار دارد. بنابراین تعديل الگوی شیوه زندگی به سمت شیوه زندگی فعال‌تر می‌تواند نقش پیش‌گیرنده در بروز ژن چاقی در افراد مستعد داشته باشد.

دریافت‌های تغذیه‌ای و فعالیت بدنی بر روی این رابطه نیز بررسی شد. بررسی ژنوتیپ با روش fluorogenic PCR شد. BMI به طور معنی‌داری با پلی‌مورفیسم ژن FTO مرتبط بود. سپس مطالعه به صورت موردن‌شاهدی انجام شد و با به کار بردن روش رگرسیون لجستیک مشخص شد که بعد از تعديل اثر سن و جنس، ژنوتیپ AA رابطه مثبت با چاقی نشان داد ( $OR = 1/53$ ) ( $p = 0.016$ ). آنالیز برای بررسی تفاوت‌های عوامل مرتبط با شیوه زندگی در بین گروه‌های ژنوتیپ نشان داد BMI به طور معنی‌داری در ژنوتیپ AA در گروه دارای فعالیت بدنی با شدت کم ( $< 3$  MET) قرار داشتند ( $p = 0.103$ ). همچنین ژنوتیپ AA با چاقی، فقط در افراد دارای فعالیت بدنی با شدت کم رابطه داشت ( $OR = 2.39$ ; 95%CI, 1.19-4.80). بنابراین در این مطالعه نتیجه‌گیری شد که واریانت ژن FTO با چاقی مرتبط است و این ارتباط در افراد دارای فعالیت بدنی با شدت کم مشاهده می‌شود که نشان دهنده وابسته بودن این ژن به فعالیت بدنی است. درنهایت، در یک مطالعه طول زندگی (life course analysis) Kaakinen (۲۶) و همکاران در سال ۱۹۶۵-۱۹۹۷ در ارتباط بین واریانت ژن (rs9939609) با BMI بزرگسالی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری برای کشف شبکه متغیرهای مرتبط با از دوران بارداری تا سن ۳۱ سالگی (۱۹۶۵-۱۹۹۷) در ۴۴۳۵ فرد شرکت کننده در مطالعه کوهورت تولد فنلاند شمالی (Northern Finland Birth Cohort) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین SNP های FTO در ناحیه rs9939609 و BMI در سن ۳۱ سالگی وجود داشت و بعد از کنترل کردن اثر چندین متغیر در طول زندگی همچنان این رابطه پابرجا ماند. اثر کلی واریانت FTO بر BMI بزرگسالان به طور عمده از اثر مستقیم تشکیل شده بود ولی یک بخش قابل توجه نیز به طور غیرمستقیم از طریق اثرش روی گسترش BMI قبلی در حال افزایش بود. علاوه بر نقش مسلم عوامل تعیین کننده ژنتیکی، بسیاری از عوامل طول زندگی نظیر فعالیت بدنی علیرغم این که هیچ اثر واسطه‌ای یا تداخلی نشان ندادند، اثر غیر مستقیم قوی بر BMI داشتند.

### نتیجه‌گیری

در این مطالعه مرورسیستماتیک، رایج ترین SNP های rs9939609 FTO مرتبط با اضافه وزن و چاقی در ژن

شهید بهشتی و هم‌چنین ریاست محترم کمیته پژوهشی  
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جهت  
حمایت‌های مالی و سایر همکاران سپاسگزاری می‌شود.

### سپاسگزاری

بدین وسیله از ریاست انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع  
غذایی کشور و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

## References

- Blakemore AI, Froguel P. Is obesity our genetic legacy? *J Clin Endocrinol Metab* 2008; 93 Suppl 1: S51-56.
- Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999–2004. *JAMA* 2006;295:1549–55.
- Popkin BM. The nutrition transition and obesity in the developing world. *J Nutr* 2001;131:S871–3.
- Knai C, Suercke M, Lobstein T. Obesity in Eastern Europe: an overview of its health and economic implications. *Econ Hum Biol* 2007;5:392-408.
- Tee ES. Obesity in Asia: prevalence and issues in assessment methodologies. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2002;11 Suppl 1:S694-701.
- Siminalayi IM, Emem-Chioma PC, Dapper DV. The prevalence of obesity as indicated by BMI and waist circumference among Nigerian adults attending family medicine clinics as outpatients in Rivers State. *Niger J Med* 2008 ;17:340-5.
- Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. *Public Health Nutr* 2002; 5: 1499-155.
- NIH: National Heart, Lung and Blood Institute. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. NIH Publication No. 98-4083.
- Stunkard AJ, Foch TT, Hrubec Z. A twin study of human obesity. *Jama* 1986; 256: 51-54.
- Malis C, Rasmussen EL, Poulsen P, Petersen I, Christensen K, et al. Total and regional fat distribution is strongly influenced by genetic factors in young and elderly twins. *Obes Res* 2005;13: 2139–2145.
- Martínez A, Parra M, Santos JL, Moreno-Aliaga MJ, Martí A, Miguel A, et al. Genotype-dependent response to energy-restricted diets in obese subjects: towards personalized nutrition. *Asia Pac J Clin Nutr* 2008;17S1:119-122.
- Qi L, Kang K, Zhang C, van Dam RM, Kraft P, Hunter D, et al. Fat mass-and obesity-associated (FTO) gene variant is associated with obesity: longitudinal analyses in two cohort studies and functional test. *Diabetes* 2008; 57: 3145-3151.
- Qi L, Marilyn C, Cuilin Z, Van-Dam RM, Frank B. Genetic predisposition, Western dietary pattern, and the risk of type 2 diabetes in men. *Am J Clin Nutr* 2009;89:1453–8.
- Tanofsky-Kraff M, Han JC, Anandalingam K, et al. The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over eating. *Am J Clin Nutr* 2009; 90, 1483–1488.
- Timpson NJ, Emmett PM, Frayling TM, et al. The fat mass and obesity-associated locus and dietary intake in children. *Am J Clin Nutr* 2008; 88, 971–978.
- Ahmad T, Lee IM, Pare' G. Lifestyle interaction with fat mass and obesity-associated (FTO) genotype and risk of obesity in apparently healthy U. S. women. *Diabetes Care* 2011; 34: 675–680.
- Wardle J, Llewellyn C, Sanderson S. The FTO gene and measured food intake in children. *Int J Obes* 2009; 33: 42–45.
- Taylor A, Sandeep M, Janipalli CS, Giambartolomei C, Evans DM, Kranthi Kumar MV, et al. Associations of FTO and MC4R Variants with Obesity Traits in Indians and the Role of Rural/Urban Environment as a Possible Effect Modifier. *Journal of Obesity* 2011; 2011: 1-7.
- Frayling TM, Timpson NJ, Weedon MN, Zeggini E, Freathy RM, Lindgren CM, et al. A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. *Science* 2007; 316: 889-894.
- Meyre D, Delplanque J, Chèvre JC, Lecoeur C, Lobbens S, Gallina S, et al. Genome-wide association study for early-onset and morbid adult obesity identifies three new risk loci in European populations. *Nat Genet* 2009; 41: 157-159.
- Thorleifsson G , Walter G B , Gudbjartsson DF, Steinhorsdottir V, Sulem P, Helgadottir A, et al. Genome-wide association yields new sequence variants at seven loci that associate with measures of obesity. *Nat Genet* 2009; 41: 18-1.
- Cha SW, Choi SM, Kim KS, Park BL, Kim JR, Kim JY, e al. Replication of genetic effects of FTO polymorphisms on BMI in a Korean population. *Obesity* 2008; 16: 2187-2189.

23. Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAtee JB, Kahn SE, Knowler WC, et al. Assessing genetreatment interactions at the FTO and INSIG2 loci on obesity-related traits in the Diabetes Prevention Program. *Diabetologia* 2008; 51: 2214-2223.
24. Hotta K, Nakata Y, Matsuo T, Kamohara S, Kotani K, Komatsu R, et al. Variations in the FTO gene are associated with severe obesity in the Japanese. *J Hum Genet* 2008; 53: 546-553.
25. Hubacek JA, Bohuslavova R, Kuthanova L, Kubinova R, Peasey A, Pikhart H, et al. The FTO gene and obesity in a large Eastern European population sample: the HAPIEE study. *Obesity* 2008; 16: 2764-2766.
26. Kaakinen M, La“ra“ E, Pouta A, Hartikainen A, Laitinen J, Tammelin TH, et al. Life-Course Analysis of a Fat Mass and Obesity-Associated (FTO) Gene Variant and Body Mass Index in the Northern Finland Birth Cohort 1966 Using Structural Equation Modeling. *Am J Epidemiol* 2010; 172: 653-665.
27. Legry V, Cottel D, Ferrières J, Arveiler D, Andrieux N, Bingham A, et al. Effect of an FTO polymorphism on fat mass, obesity, and type 2 diabetes mellitus in the French MONICA Study. *Metabolism* 2009; 58: 971-975.
28. Ng MC, Park KS, Oh B, Tam CH, Cho YM, Shin HD, et al. Implication of genetic variants near TCF7L2, SLC30A8, HHEX, CDKAL1, CDKN2A/B, IGF2BP2, and FTO in type 2 diabetes and obesity in 6,719 Asians. *Diabetes* 2008; 57: 2226-2233.
29. Rong R, Hanson RL, Ortiz D, Wiedrich C, Kobes S, Knowler WC, et al. Association analysis of variation in/near FTO, CDKAL1, SLC30A8, HHEX, EXT2, IGF2BP2, LOC387761, and CDKN2B with type 2 diabetes and related quantitative traits in Pima Indians. *Diabetes* 2009; 58: 478-488.
30. Stein CM, Song Y, Elston RC. Structural equation model based genome scan for the metabolic syndrome. *BMC Genet*. 2003; 31 suppl 1:S99.
31. Tse K. Sample size calculation: influence of confounding and interaction effects [dissertation]. Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology; 2006; page 173.
32. Omori S, Tanaka Y, Takahashi A, Hirose H, Kashiwagi A, Kaku K, et al. Association of CDKAL1, IGF2BP2, CDKN2A/B, HHEX, SLC30A8, and KCNJ11 with susceptibility to type 2 diabetes in a Japanese population. *Diabetes* 2008; 57: 791-795.
33. Sjögren M, Lyssenko V, Jonsson A, Berglund G, Nilsson P, Groop L, et al. The search for putative unifying genetic factors for components of the metabolic syndrome. *Diabetologia* 2008; 51: 2242-2251.
34. Tan JT, Dorajoo R, Seielstad M, Sim XL, Ong RT, Chia KS, et al. FTO variants are associated with obesity in the Chinese and Malay populations in Singapore. *Diabetes* 2008; 57: 2851-2857.
35. Villalobos-Comparán M, Teresa Flores-Dorantes M, Teresa Villarreal-Molina M, Rodríguez-Cruz M, García-Ulloa AC, Robles L, et al. The FTO gene is associated with adulthood obesity in the Mexican population. *Obesity* 2008; 16: 2296-2301.
36. Dina C, Meyre D, Gallina S, Durand E, Körner A, Jacobson P, et al. Variation in FTO contributes to childhood obesity and severe adult obesity. *Nature genetics* 2007; 39: 724-6.
37. Price RA, Li WD, Zhao H. FTO gene SNPs associated with extreme obesity in cases, controls and extremely discordant sister pairs. *BMC medical genetics* 2008; 9: 4-8.
38. Grant SFA, Li M, Bradfield JP, Kim CE, Annaiah K, Santa E, et al. Association analysis of the FTO gene with obesity in children of Caucasian and African ancestry reveals a common tagging SNP. *PloS one*. 2008; 3: e1746.
39. Jacobsson JA, Danielsson P, Svensson V, Klovins J, Gyllensten U, Marcus C, et al. Major gender difference in association of FTO gene variant among severely obese children with obesity and obesity related phenotypes. *Biochemical and biophysical research communications*. 2008; 368(3): 476-82.
40. Attaoua R, Ait El Mkadem S, Lautier C, Kaouache S, Renard E, Brun JF, et al. Association of the FTO gene with obesity and the metabolic syndrome is independent of the IRS-2 gene in the female population of Southern France. *Diabetes & metabolism* 2009; 35(6): 476-83.
41. Taylor A, Sandeep M, Janipalli C, Giambartolomei C, Evans D, Kumar K, et al. Associations of FTO and MC4R variants with obesity traits in Indians and the role of rural/urban environment as a possible effect modifier. *Journal of obesity* 2011; 2011: 1-5.
42. Macekova S, Bernasovsky I, Gabrikova D, Bozikova A, Bernasovska J, Boronova I, et al. Association of the FTO rs9939609 Polymorphism With Obesity in Roma/Gypsy Population. *American journal of physical anthropology*. 2012; 147(1): 30-34.
43. Do R, Bailey SD, Desbiens K, Belisle A, Montpetit A, Bouchard C, et al. Genetic variants of FTO influence adiposity, insulin sensitivity, leptin levels, and resting metabolic rate in the Quebec Family Study. *Diabetes* 2008; 57(4): 1147-50.

43. Speakman JR, Rance KA, Johnstone AM. Polymorphisms of the FTO gene are associated with variation in energy intake, but not energy expenditure. *Obesity* 2008;16(8):1961-5.
44. Johnson L, van Jaarsveld CHM, Emmett PM, Rogers IS, Ness AR, Hattersley AT, et al. Dietary energy density affects fat mass in early adolescence and is not modified by FTO variants. *PloS one* 2009;4(3):e4594.
45. Lappalainen T, Lindström J, Paananen J, Eriksson JG, Karhunen L, Tuomilehto J, et al. Association of the fat mass and obesity-associated (FTO) gene variant (rs9939609) with dietary intake in the Finnish Diabetes Prevention Study. *British Journal of Nutrition*. 2012;107(1):1-7.
46. Lee HJ, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and physical activity in Koreans. *Clinica Chimica Acta*. 2010;411: 1716-22.
47. Karasawa S, Daimon M, Sasaki S, Toriyama S, Oizumi T, Susa S, et al. Association of the Common Fat Mass and Obesity Associated (FTO) Gene Polymorphism with Obesity in a Japanese Population. *Endocrine journal*. 2010;57(4):293-301.

## Common single nucleotide polymorphisms of the fat mass and obesity associated (FTO) gene and their association with obesity and lifestyle factors: a systematic review

Rezazadeh A \*<sup>1</sup>

1. \*Corresponding author: Students' Research Committee, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  
Email: arezoo.rezazaeh@gmail.com

### Abstract

Several studies conducted in the entire human genome have shown that the FTO (Fat mass and Obesity associated) gene is most associated with obesity. FTO gene is highly poly morph and several polymorphisms of this gene are associated with obesity. The aim of the present study was to systematically review the gene polymorphism associated with obesity and the role of nutrition and lifestyle.

Papers used in this study were collected by searching the Medline, EMBASE, CINAHL, ProQuest, pubmed and Scopus databases and thesis and journals. Key words used for the search were: Gene Polymorphism, obesity, FTO, Fat mass and Obesity associated, diet, physical activity. Studies were limited to human studies in English and Persian languag. All articles between year 2000 and 2012 meeting the inclusion criteria were enrolled in the study.

**Findings:** 28 articles were found in the systematic search of databases, of which 18 articles were selected after removal of duplicate articles and papers related to our criteria. The relationship between energy expenditure and energy intake with the FTO gene variants were contradictory. In most studies, high dietary fat intake and obesity risk alleles were significantly associated with the frequency. In most studies, the minor allele was significantly associated with overweight and obesity gene variants in subjects with low physical activity.

This study showed that the relation between risk allele associated and overweight and obesity are strongly influenced by lifestyle (energy intake, physical activity and dietary pattern) factors. So modifying the lifestyle pattern may have a preventive role in obesity gene expression in vulnerable people.

**Keywords:** Obesity, FTO gene, Single nucleutid polymorphisms, Lifestyle, Systematic Review