

بررسی اثر ضد میکروبی پوشش کربوکسی متیل سلولز به همراه عصاره برگ بو و تأثیر آنها بر افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

بهرنگ حافظی^۱، سیده ام البنین قاسمیان^۲، احسان قریب ممبنی^۱

۱- گروه دامپژشکی، واحد شوستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوستر، ایران

۲- نویسنده مسئول: گروه دامپژشکی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران. پست الکترونیکی: Ghasemian1249@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۲/۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۴

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از پوشش‌های خوراکی به عنوان تکنولوژی مدرن علاوه بر سازگاری با محیط، غیرسمی و قابل مصرف بودن، مواد غذایی را از آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حفظ می‌کنند. در این مطالعه به ارزیابی اثرات ضد اکسیدانی و ضد میکروبی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز (CMC) به همراه عصاره اتانولی برگ بو بر ماندگاری گوشت مرغ پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: در این راستا با تهیه برش‌هایی از گوشت سینه مرغ، در قالب ۸ تیمار با ۳ تکرار به بررسی اثرات CMC با غلظت ۲ درصد به تنهایی و همراه با عصاره برگ بو با غلظت‌های ۱، ۲ و ۴ درصد بر بار میکروبی کل، جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه و شاخص‌های ضد اکسیدانی TVB-N، TBARS و اندیس پراکسید پرداخته شد. ارزیابی شاخص‌ها در زمان شروع مطالعه و نیز در زمان‌های ۴، ۸ و ۱۲ روز پس از پوشش دهی در دمای یخچال (۴ درجه سانتی‌گراد) انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد در شروع مطالعه تیمارهای مختلف از نظر شاخص‌های مورد بررسی اختلاف آماری نشان ندادند اما با افزایش زمان در تمامی گروه‌ها میزان بار میکروبی و جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه به صورت معنی‌داری افزایش یافت ($p < 0.05$). علاوه بر آن، شاخص‌های اکسیدانی نیز با گذشت زمان افزایش نشان داد. آنالیز آماری یافته‌ها نشان می‌دهد در تمامی زمان‌های بررسی شده بیشترین بار میکروبی و شاخص‌های اکسیدانی در گروه کنترل و گروه پوشش دار شده با CMC به تنهایی مشاهده شده است که این دو گروه در تمامی زمان‌ها با یکدیگر اختلاف آماری نشان ندادند. علاوه بر آن، کمترین بار میکروبی و شاخص‌های اکسیدانی در گروه‌های دریافت‌کننده پوشش خوراکی به همراه عصاره مشاهده شده است که در این گروه غلظت ۴ درصد عصاره برگ بو بیشترین کاهش در بار میکروبی شاخص‌های اکسیدانی و پراکسیدانی را در گوشت مرغ نشان داده است.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده همزمان عصاره برگ بو (با غلظت ۴ درصد) و CMC می‌تواند با اثر ممانعتی بر رشد باکتری‌ها و همچنین کاهش میزان pH، ازت فرار، پراکسید و TBARS در طول دوره‌ی نگهداری گوشت، باعث افزایش زمان نیمه‌عمر گوشت مرغ در شرایط یخچال می‌شود. درنتیجه، در حفظ کیفیت بهداشتی گوشت مرغ تا زمان طبخ مؤثر باشد.

وازگان کلیدی: گوشت مرغ، پوشش دهی، کربوکسی متیل سلولز، برگ بو، *Laurus nobilis*

پیام‌های اصلی:

- یکی از منابع مهم تأمین پروتئین در کشورهای مختلف از جمله ایران گوشت مرغ می‌باشد.
- با گذشت زمان بار میکروبی و جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه در گوشت مرغ افزایش می‌یابد.
- با استفاده از عصاره برگ بو (با غلظت ۴ درصد) و کربوکسی متیل سلولز (CMC)، می‌توان بار میکروبی، شاخص‌های اکسیدانی و پراکسیدانی را در گوشت مرغ کاهش داد و به افزایش زمان ماندگاری گوشت کمک کرد.

• مقدمه

محلول تشکیل دهنده فیلم، غوطه‌ور شده و اجازه داده می‌شود تا این محلول بر روی گوشت خشک شود. این روش باعث ایجاد پوشش یکنواخت در سطح ماده غذایی می‌شود (۳).

در بین پوشش‌های خوارکی، می‌توان از سلولز و مشتقات سلولز نام برد که در دهه گذشته، به دلیل خواص منحصر به فرد زیست محیطی از جمله تجزیه تخریب پذیری، خوارکی و غیرسمی بودن توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. کربوکسی متیل سلولز CMC (Carboxymethyl Cellulose) یک پلیمر محلول در آب، آئیونیک و خطی با وزن مولکولی به- نسبت بالا و محلول در آب سرد و گرم بوده، بنابراین در موارد مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. به صورت معمول به فرم نمک‌های سدیم و کلسیم موجود می‌باشد. کربوکسی متیل سلولز یک ترکیب بدون بو و بدون مزه است و بطور گسترده در انواع غذاها مانند سس‌های سالاد، دسرها و آشامیدنی‌ها برای جلوگیری از جداسازی وزنی ذرات پراکنده و بهبود بافت و احساس دهانی به کار می‌رود (۴).

در سال‌های اخیر استفاده از محصولات گیاهی مانند انسس و عصاره گیاهان (همانند؛ برگ‌مو، پره‌موم و غیره) نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است (۵). ادعا شده است که انسس‌ها به عنوان متابولیت‌های ثانویه ایمن بوده و به عنوان جایگزین افزودنی‌های مصنوعی شناخته می‌شوند. این ترکیبات علاوه بر اینکه بی‌ضرر می‌باشند، طیف وسیعی از اثرات ضد میکروبی و ضد اکسیدانی را در تحقیقات مختلف نشان داده‌اند. بنابراین استفاده از این مواد سالم و بی‌خطر می‌تواند به عنوان یک روش جایگزین برای کنترل عوامل بیماریزا و فسادزا و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی کاربرد داشته باشد. مکانیسم اثر ضد باکتریایی عصاره‌های گیاهی به خاصیت آبگریزی آن‌ها بر می‌گردد که موجب نفوذ این مواد به فسفولیپیدهای غشاء سلول باکتری‌ها شده و سبب اختلال در ساختمان‌های آن‌ها و افزایش نفوذ پذیری می‌شود. این مسئله موجب خروج و نشت یون‌ها و دیگر محتويات سلولی شده که درنهایت مرگ سلول را در بر خواهد داشت (۶).

برگ‌بو (Laurus nobilis) نام گونه‌ای از سرده برگ‌بو است. گیاهی خوشبو و همیشه‌سیز است که اصل آن از منطقه مدیترانه است و در تمام مدیترانه به عنوان عطر غذا از آن استفاده می‌شود. معمولاً در تمام فصول سال سبز است و استفاده اصلی آن در آشپزی و به عنوان داروی گیاهی است (۷). با بررسی اثرات عصاره اتانولی برگ‌بو بر مهار رادیکال‌های آزاد،

یکی از منابع مهم تأمین پروتئین در کشورهای مختلف از جمله ایران گوشت مرغ می‌باشد. بهدلیل خصوصیاتی از قبیل چربی کمتر، طبخ آسان و سریع، کام‌پذیری، قیمت‌پایین تولید، سهل‌الهضم بودن و امکان تولید بیشتر و آسان‌تر نسبت به سایر انواع گوشت‌ها ارجحیت یافته است. گوشت مرغ بر مبنای قوانین سازمان دامپزشکی حداقل ۷۲ ساعت در دمای یخچال ماندگاری دارد (۱). معمولاً با گذشت این زمان در اثر دو عامل تغییرات شیمیایی یا افزایش بار میکروبی دچار فساد می‌شود. آلدگی میکروبی یکی از عوامل اصلی فساد فرآورده‌های طیور نگهداری شده در شرایط سرد می‌باشد که منجر به افت کیفیت و فساد محصول می‌گردد (۱).

تندشدن اکسیداتیو یا اکسیداسیون چربی‌ها مهمترین نوع فساد شیمیایی در گوشت مرغ است. این نوع از فساد در اثر به وجود آمدن رادیکال‌های آزاد از اسیدهای چرب و تولید ترکیبات آلدیدی حاصل می‌شود. اکسیداسیون چربی فرآیند پیچیده‌ی است که سرعت آن بسته به عوامل مختلفی نظیر ترکیبات شیمیایی محصول، حضور یا عدم حضور نور، اکسیژن و دمای محیط نگهداری متغیر می‌باشد. اثرات تندی اکسیداتیو در گوشت طیور می‌تواند بحسب تغییر گسترده در طعم، ایجاد بوی نامطبوع، توسعه سریع تندی، کاهش رنگ و آسیب به ساختار پروتئین‌ها تا حد زیادی متفاوت باشد. با پیشرفت اکسیداسیون و افزایش تندی، محصول قابل مصرف نمی‌باشد ولی قبل از رسیدن به این درجه، با تولید مولکول‌های مسمومیت‌زا نیز می- تواند به سلامت مصرف کننده آسیب وارد کند (۲).

امروزه استفاده از پوشش‌های خوارکی طبیعی مانند استفاده از بیوپلیمرهایی از قبیل نشاسته، صمغ‌ها، مشتقات سلولز، کیتوزان و ژلاتین در مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از پوشش‌های خوارکی به عنوان تکنولوژی مدرن علاوه بر داشتن فوایدی مانند قابلیت خوردن، ساختمان‌ظاهری زیبا، سازگاری با محیط، غیرسمی و ارزان بودن، مواد غذایی را از آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حفظ می‌کند و مانند سدی در برابر تبادل گازها، رطوبت و میکروارگانیسم‌ها عمل- نموده و کیفیت و ماندگاری ماده‌غذایی را در فاصله تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده حفظ می‌نماید. برای استفاده از پوشش خوارکی در مواد غذایی، می‌توان از روش‌های پوشش‌دهی (غوطه‌وری)، اسپری محلول به سطح غذا و یا تولید فیلم خوارکی استفاده کرد. در روش پوشش‌دهی گوشت در

محلول رویی (عصاره‌ی الکلی) توسط کاغذصافی فیلترگردید و عمل تغليظ با حرارت غیرمستقیم بن‌ماری (دماه ۰° عدرجه سانتی‌گراد) انجام گرفت تا زمانی که الکل آن بهصورت کامل تبخیرشد و عصاره بهصورت خشک و پودر درآمد.^(۹)

تهیه محلول پوشش کربوکسی متیل سلولز
 برای تهیه محلول پوشش کربوکسی متیل سلولز، از پودر کربوکسی متیل سلولز (سیگما آلدريچ، آمریکا) که یک پودر سفیدرنگ، بی‌بو، بدون رنگ، و قابل تعليق در آب است، استفاده گردید. ۱۰ گرم کربوکسی متیل سلولز توزین گردید و با ۵۰۰ میلی‌لیتر آب مقطور مخلوط گردید. سپس محلول کربوکسی متیل سلولز تهیه شده با عصاره برگ‌بو با غلظت‌های ۱، ۲ و ۴ درصد مخلوط شد و برای ایجاد محلولی شفاف و یکنواخت برای مدت ۳۰ دقیقه همzedه شد.^(۱۰)

پوشش‌دهی نمونه‌ها

جهت پوشش‌دهی نمونه‌های گوشت، گوشت‌های سینه‌مرغ به فیله‌هایی با وزن ۱۰۰ گرم برش داده شدند و به مدت ۱۰ ثانیه در محلول تهیه شده کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره برگ‌بو غوطه‌ور شدند تا بهصورت کامل آن‌ها را بپوشاند. گوشت‌های پوشش‌دهی شده بهمنظور حذف پوشش‌های اضافی به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند تا پوشش خشک شود. سپس نمونه‌ها در ظروف شیشه‌ای درب‌دار به مدت ۱۲ روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و آزمون‌های شیمیایی و میکروبی، در فواصل زمانی ۴ روزه (۰، ۴، ۸ و ۱۲) بر روی نمونه‌ها انجام شد. یک نمونه گوشت بدون پوشش نیز در شرایط یکسان به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد.^(۱۱)

تیمارهای مختلف با پوشش کربوکسی متیل سلولز و با غلظت‌های مختلف عصاره برگ‌بو (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) در ۵ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند که در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. فرمولاسیون محلول‌های پوشش‌دهی

| فرمول | کد تیمار | شماره گروه‌ها | کنترل بدون محلول‌های پوشش‌دهی |
|------------------|----------|---------------|-------------------------------|
| CMC* | C | ۱ | |
| CMC* 2% | CMC | ۲ | |
| CMC 2% + LN** 1% | CS1 | ۳ | |
| CMC 2% + LN 2% | CS2 | ۴ | |
| CMC 2% + LN 4% | CS4 | ۵ | |
| LN 1% | S1 | ۶ | |
| LN 2% | S2 | ۷ | |
| LN 4% | S4 | ۸ | |

* CMC: Carboxymethyl Cellulose (کربوکسی‌متیل سلولز)

**LN: Laurus nobilis (برگ‌بو)

مهار پراکسیدهیدروژن، مهار رادیکال آنیون‌سوپراکسید و بررسی میزان شلاته‌کنندگی فلزات، فعالیت ضداکسیدانی قوی برگ‌بو به اثبات رسیده است. فعالیت ضداکسیدانی عصاره‌اتanolی برگ‌بو، ممکن است به‌دلیل ترکیبات فنلی موجود در عصاره باشد. لازم به توضیح است، با اندازه‌گیری مقادیر تیوباربیتوریک اسید در نمونه‌ها، میزان اکسیداسیون چربی‌ها مشخص می‌گردد. همچنین، افزایش میزان بازهای نیتروژنی فرار به‌دلیل فرایندهای آنزیمی مانند اکسیداسیون آمین، تخریب نوکلوتید و دامیناسیون آسیدهای آمینه آزاد می‌باشد.^(۸)

از آنجاکه میزان بالای پروتئین و رطوبت سبب فساد میکروبی گوشت مرغ شده و شرایط هوایی موجب افزایش اکسیداسیون لیپید و پروتئین می‌شود، در نتیجه کاهش رشد-میکروبی و تأخیر در اکسیداسیون لیپید و پروتئین در طول نگهداری می‌تواند منجر به افزایش ماندگاری گوشت شود. از آنجایی که فساد گوشت مرغ باعث به خطر اندختن سلامت مصرف‌کنندگان و یک تحمیل اقتصادی برای تولیدکنندگان این محصول بوده و نیز حفظ کیفیت و افزایش مدت زمان ماندگاری انواع گوشت از جمله گوشت مرغ از اهداف تولیدکنندگان و محققین صنایع غذایی می‌باشد، با توجه به نگرانی مصرف-کنندگان از مصرف مواد غذایی با افزودنی‌های شیمیایی و تمایل به مصرف مواد غذایی سالم‌تر با افزودنی‌های طبیعی و با کیفیت بالا و ماندگاری طولانی، در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های جدید و افزودنی‌های طبیعی در مواد غذایی رو به گسترش است. با توجه به نکات فوق، در تحقیق حاضر بهره‌گیری از تکنیک پوشش‌دار کردن توسط کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره برگ‌بو بر روی فیله‌های تازه گوشت مرغ به منظور افزایش مدت زمان نگهداری آن‌ها و تعیین پارامترهای شیمیایی، پایداری اکسیداتیو و ارزیابی میکروبیولوژی فرآورده مورد بررسی قرار گرفته است. براساس اطلاعات، تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی اثرات ضد اکسیدانی و ضد میکروبی پوشش خوارکی کربوکسی-متیل سلولز و عصاره برگ‌بو بر ماندگاری گوشت مرغ منتشر نشده است.

۰ مواد و روش‌ها

استخراج عصاره اتانولی برگ‌بو

برای استخراج عصاره اتانولی برگ‌بو از روش خیساندن استفاده گردید. در ابتدا قطعات برگ‌بو شسته شد و به صورت کامل خشک گردید، سپس با ساییدن در بوته‌چینی استریل به صورت کامل به شکل پودر درآمد. در ادامه، ۲۰۰ گرم از پودر حاصل در یک لیتر الکل اتانول ۹۶ درصد شناور گردید و پس از گذشت ۷۲ ساعت (در دمای اتاق و حدود ۲۲ درجه سانتی‌گراد)

$$PV = \frac{V \times N \times 1000}{m}$$

رابطه ۱

V: حجم مصرفی تیوسولفات، N: نرمالیته، m: وزن نمونه

همچنین عدد شاخص عدد تیوباربیتوريک اسید TBARs (Thiobarbituric acid reactive substances) روش AOCS به شماره Cd19-90 محاسبه شد. برای اندازه‌گیری اندیس تیوباربیتوريک اسید، ۲۰۰ میلی‌گرم از نمونه گوشت میکس شده به بالن ۲۵ میلی‌لیتر انتقال و با بوتانول به حجم رسانده شد. در ادامه، ۵ میلی‌لیتر از این محلول، به لوله فالکن خشک درب دار انتقال داده شد که از انحلال ۲۰۰ میلی-گرم پودر اسید تیوباربیتوريک TBA (Thiobarbituric acid) با حل ۱۰۰ میلی‌لیتر حلal بوتانول و صاف کردن به وسیله کاغذ-صافی به دست آمده به آن افزوده شد. سپس لوله‌ها در بن‌ماری با دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت قرار داده شد و سپس در دمای محیط سرد گردیدند، در ادامه، با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر میزان جذب آن‌ها در ۵۳۰ نانومتر (As) در مقابل شاهد آب‌م قطر (Ab)، برحسب میلی‌گرم مالون دی-آلائید در کیلوگرم روغن قرائت شد و با استفاده از رابطه ۲، میزان TBA محاسبه شد (۱۳).

$$TBA = \frac{50 \times (A1 - A2)}{300}$$

رابطه ۲

A1: جذب نمونه، A2: جذب شاهد

شمارش تمام باکتری‌ها

جهت بررسی آزمون میکروبی، شمارش تمام باکتری‌ها (Total viable count) انجام گردید. تحت شرایط استریل و در زیر هود آزمایشگاهی، ظروف حاوی نمونه، باز گردید و مقدار ۱۰ گرم از گوشت توسط پنس و قیچی استریل جدا شده و در کیسه‌های پلاستیکی استریل مخصوص قرار داده شدند و سپس ۹۰-میلی‌لیتر محلول رینگ استریل به آن افزوده گردید و سپس کیسه جهت هموژنیزاسیون محتويات به دستگاه استومیکر به مدت ۳ دقیقه منتقل شد. سپس با اضافه کردن ۱ میلی‌لیتر به لوله حاوی ۹ میلی‌لیتر رینگ، رقت‌های بعدی آماده و به این ترتیب رقیق‌سازی متواالی انجام شد و بر روی پلیت‌های حاوی محیط کشت آغاز مغذی و به روش کشت سطحی، کشت داده شدند. جهت شمارش کلی باکتری‌ها پلیت‌های کشت داده شده به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور ۳۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند (۱۲).

برای جستجو و شمارش کلی فرم‌ها (خانواده انتروباكتریاسه)، از رقت‌های مختلف تهیه شده از هر نمونه در محیط کشت و بولت رد بایل آگار (Violet Red Bile Agar) VRBA (Violet Red Bile Agar) کشت دولایه داده شد و در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شد. به منظور آزمایش کلی فرم‌های تأییدی کلنی‌های

نحوه اندازه‌گیری pH، TVB-N، PV و TBARs

برای تعیین pH نمونه‌ها، ۵ گرم نمونه گوشت با ۴۵ میلی‌لیتر آب‌م قطر دیونیزه به مدت ۱ دقیقه با سرعت ۱۰۰ دور در دقیقه در دمای اتاق هموژنیزه شد و اندازه‌گیری pH با دستگاه pH متر صورت گرفت.

برای اندازه‌گیری ترکیبات ازته فرار کل، میزان نیتروژن پایه فرار کل (Total Volatile Basic Nitrogen) TVB-N مورد ارزیابی قرار گرفت، محتوای N TVB-N پس از افزودن MgO به نمونه چرخ شده با تقطیر مشخص می‌شود. تقطیرات در یک فلاسک حاوی محلول آبی ۳٪ (w/v) اسیدبوریک و یک نشانگ با حل کردن ۰/۱ گرم متیل‌فرمز و ۰/۰۵ گرم متیلن آبی به ۱۰۰ میلی‌لیتر اتانول جمع‌آوری شد. در پایان، محلول اسیدبوریک با محلول ۰/۰۱ مولار هیدروکلراید تا زمان صورتی رنگ شدند، تیتر گردید. مقدار TVB-N به صورت میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم نمونه محاسبه شد (۱۲).

جهت بررسی میزان اکسیداسیون گوشت، اندیس پراکسید (Peroxide Value) PV اندازه‌گیری عدد پراکسید از روش AOCS به شماره Cd 8-53 استفاده شد. لازم به توضیح می‌باشد، افزایش میزان بازهای نیتروژنی فرار به دلیل فرایندهای آنزیمی مانند اکسیداسیون آمین‌ها، تخریب نوکلئوتیدها و دامیناسیون آسیدهای آمینه آزاد می‌باشد، که معیاری جهت سنجش میزان اکسیداسیون می‌باشد. عدد پراکسید برحسب میلی‌اکی وalan پراکسید در ۱۰۰ گرم روغن بیان شده است. برای تعیین عدد پراکسید، ابتدا ۱۵ گرم از نمونه گوشت، در دکانتور ۵۰۰ میلی‌لیتر قرار داده شد. سپس ۳۰ میلی‌لیتر کلروفرم به آن اضافه گردید و بعد از مخلوط نمودن، ۳۰ میلی‌لیتر کلروفرم و ۶۰ میلی‌لیتر متانول نیز، افزوده شد. پس از ۱۲-۲۴ ساعت، ۳۶ میلی‌لیتر آب‌م قطر به نمونه افزوده شد. سپس، به نمونه‌ها به مدت ۱-۲ ساعت استراحت داده شد تا سه فاز تشکیل شود. ۲۰ میلی‌لیتر از فاز پایینی، به ارلن‌مایر انتقال داده شد و ۲۵ میلی‌لیتر اسیداستیک کلروفرمی (نسبت کلروفرم به اسیداستیک ۳:۲) به آن افزوده شد. سپس ۵/۰ میلی‌لیتر محلول یدور پتابسیم اشباع و ۳۰-میلی‌لیتر آب‌م قطر به محتويات ارلن اضافه شد. محتويات ارلن به مدت ۱ دقیقه در تاریکی قرار داده شد و ۵/۰ میلی‌لیتر معرف نشاسته ۱٪ به آن افزوده شد. محلول به شدت هم‌زد شد تا ید آزاد شده باعث تغییر رنگ محلول شود. سپس با محلول تیوسولفات ۰/۰۱ نرمال تا بی‌رنگ شدن محلول یا ظهور رنگ شیری و شفاف شدن فاز بالایی روغن تیتر شد و در نهایت با استفاده از رابطه ۱، میزان پراکسید برحسب میلی‌اکی وalan پراکسید در یک کیلوگرم چربی محاسبه شد (۱۱).

از گروه‌های تیمار بود، pH گروه کنترل برخلاف گروه‌های تیمار به بالای ۵/۵ رسید ($p<0.05$). تغییرات pH در طول زمان و در گروه‌های مختلف در نمودار ۱ آمده است.

ارزیابی شاخص ازته فرار کل (TVB-N)

میزان TVB-N در ابتدای مطالعه در تمامی گروه‌های تیمار یکسان بود و اختلاف معنی‌دار نداشت. با گذشت زمان میزان TVB-N در تمامی گروه‌ها به طور معنی‌دار افزایش داشت ($p<0.05$).

مقایسه تیمارها نشان داد در تمامی زمان‌ها بیشترین میزان TVB-N در گروه کنترل بوده است که تفاوت معنی‌دار با گروه پوشش داده شده با CMC نداشت اما میزان TVB-N در این دو گروه به طور معنی‌دار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است ($p<0.05$). همچنین کمترین میزان TVB-N در روند نگهداری در یخچال در گوشت مرغ‌هایی دیده می‌شود که با CMC به همراه ۴ درصد عصاره برگ‌بو پوشش دهی شدند. در تمامی گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌دار با گروه کنترل دیده شد، اما با افزایش دوز عصاره برگ‌بو در پوشش دهی با عصاره برگ‌بو به تنها یی و یا در زمانی که از CMC به همراه عصاره استفاده شده است یک روند کاهش در میزان TVB-N با افزایش غلظت عصاره برگ‌بو دیده می‌شود. همچنین در گروه‌های استفاده شده از برگ‌بو و CMC به طور معنی‌دار میزان TVB-N کمتر از گروه‌هایی است که از عصاره برگ‌بو به تنها یی استفاده شده است. تغییرات میزان شاخص ازته فرار کل (TVB-N) در طول زمان و در گروه‌های مختلف در نمودار ۲ آمده است.

مشکوک به کلی فرم‌های احتمالی (ارغوانی رنگ) به محیط آبگوشت سبز در خشان منتقل شد و ۴۸ ساعت در ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌خانه‌گذاری شد و سپس توسط آزمایش‌های بیوشیمیای تأیید گردیدند.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از آزمون دو طرفه (ANOVA) و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ استفاده گردید. برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل (۲۰۱۶) استفاده شد.


۰ یافته‌ها

ارزیابی pH نمونه‌ها

مقایسه pH گوشت مرغ در شروع مطالعه نشان داد که تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌ها وجود ندارد و نمونه‌های گوشت مرغ استفاده شده در مطالعه وضعیت مشابه‌ای از لحاظ pH داشته‌اند. بدین صورت که pH نمونه‌ها در محدوده‌ی ۵ الی ۵/۵ بود.


مقایسه pH در طول روند نگهداری تیمارهای مختلف گوشت مرغ در یخچال نشان داد که با افزایش مدت نگهداری گوشت مرغ در یخچال میزان pH افزایش می‌یابد. در تمامی گروه‌ها با افزایش مدت ماندگاری میزان pH به صورت معنی‌دار افزایش یافت ($p<0.05$).

مقایسه میزان pH گوشت مرغ در تیمارهای مختلف در تمامی مقاطع زمانی در تمامی گروه‌ها یکسان بود و اختلاف آماری وجود نداشت. اما میزان pH در گروه کنترل به جز در شروع مطالعه، در تمامی مقاطع زمانی به صورت معنی‌دار بیشتر



نمودار ۱. (ارزیابی pH نمونه‌ها): مقایسه میانگین تغییرات میزان pH گوشت مرغ در گروه‌های مختلف، در طول زمان ۱۲ روز نگهداری در دمای یخچال

آبی روشن: زمان شروع مطالعه، قرمز: پس از ۴ روز، سبز پس از ۸ روز و بنفش پس از ۱۲ روز را نشان می‌دهد. در تمامی گروه‌ها با افزایش مدت زمان نگهداری، میزان pH به صورت معنی‌دار افزایش یافت. میزان pH در گروه کنترل (گروه شماره ۱)، در تمامی مقاطع زمانی به صورت معنی‌دار بیشتر از گروه‌های تیمار (گروه‌های ۲ الی ۸) بود ($p<0.05$).



نمودار ۲. (ارزیابی شاخص ازته فار کل (TVB-N)): مقایسه میانگین تغییرات TVB-N در گروه‌های مختلف در طول زمان ۱۲ روز

نگهداری در دمای یخچال

آبی روش: زمان شروع مطالعه، قرمز: پس از ۴ روز، سبز: پس از ۸ روز و بنفش: پس از ۱۲ روز را نشان می‌دهد. در تمامی گروه‌ها با افزایش مدت زمان نگهداری، میزان TVB-N به صورت معنی‌دار افزایش یافته. در تمامی زمان‌ها بیشترین افزایش میزان TVB-N در گروه کنترل (شماره ۱) مشاهده می‌شود. در گروه‌های استفاده شده از برگ بو و CMC (گروه‌های شماره ۳ الی ۵) به صورت معنی‌دار کمتر از میزان TVB-N است که از عصاره برگ بو به تنها یکی (گروه‌های شماره ۶ الی ۸) استفاده شده است ($p<0.05$).

ارزیابی شاخص پراکسید

میزان پراکسید در ابتدای مطالعه در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معنی‌دار نداشت. با گذشت زمان میزان پراکسید در تمامی گروه‌ها به طور معنی‌دار افزایش یافته است ($p<0.05$). مقایسه تیمارها نشان می‌دهد در تمامی زمان‌ها بیشترین میزان پراکسید در گروه کنترل مشاهده می‌شود که تفاوت معنی‌دار با گروه پوشش داده شده با CMC نداشت اما میزان پراکسید در این دو گروه به طور معنی‌دار بالاتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

کمترین میزان پراکسید در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگ بو به همراه CMC مشاهده شده است که به طور معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

با افزایش دوز عصاره برگ بو در پوشش دهی با عصاره برگ بو به تنها یکی و یا در زمانی که از CMC به همراه عصاره استفاده شده است یک روند کاهش وابسته به دوز عصاره برگ بو مشاهده می‌شود.

در تمامی مقاطع زمانی تیمارهای پوشش دار شده با CMC و عصاره برگ بو به طور معنی‌دار پراکسید کمتری نسبت به گروه‌هایی که فقط از CMC یا عصاره استفاده کرده مشاهده شده است ($p<0.05$).

در بین گروه‌های استفاده کننده از دوزهای مختلف عصاره تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است.


ارزیابی شاخص عدد تیوباربیتوريک اسید (TBARs)

میزان TBARs در ابتدای مطالعه در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معنی‌دار نداشت. با گذشت زمان میزان TBARs در تمامی گروه‌ها به طور معنی‌دار افزایش یافته است ($p<0.05$). مقایسه تیمارها نشان می‌دهد در تمامی زمان‌ها بیشترین میزان TBARs در گروه کنترل مشاهده می‌شود که تفاوت معنی‌دار با گروه پوشش داده شده با CMC نداشت اما میزان TBARs در این دو گروه به طور معنی‌دار بالاتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

کمترین میزان TBARs در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگ بو به همراه CMC مشاهده شده است که به طور معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

با افزایش دوز عصاره برگ بو در پوشش دهی با عصاره برگ بو به تنها یکی و یا در زمانی که از CMC به همراه عصاره استفاده شده است یک روند کاهش وابسته به دوز عصاره برگ بو مشاهده می‌شود.

گروه‌های دریافت‌کننده CMC به همراه عصاره میزان TBARs کمتری نسبت به هر کدام از تیمارهای استفاده کننده از CMC یا عصاره به تنها یکی نشان داده‌اند که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بوده است ($p<0.05$). تغییرات میزان شاخص عدد تیوباربیتوريک اسید (TBARs) در طول زمان و در گروه‌های مختلف در نمودار ۳ آمده است.



نمودار ۳. (ارزیابی شاخص عدد تیوباریتوريک اسید (TBARs)): مقایسه میانگین تغییرات TBARs در گروه‌های مختلف در طول زمان ۱۲ روز نگهداری در دمای یخچال

آبی روشن: زمان شروع مطالعه، قرمز: پس از ۴ روز، سبز پس از ۸ روز و بنفش پس از ۱۲ روز را نشان می‌دهد. در تمامی گروه‌ها با افزایش مدت زمان نگهداری، میزان TBARs به صورت معنی‌دار افزایش یافته. کمترین میزان TBARs در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگبو به همراه CMC مشاهده می‌شود (گروه شماره ۵) که به صورت معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

در تیمارهای مختلف در طول زمان و در گروه‌های مختلف در نمودار ۴ آمده است.

شمارش باکتری‌های زنده

شمارش باکتری‌های زنده در ابتدای مطالعه در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معنی‌دار نداشت. با گذشت زمان تعداد باکتری‌های زنده در تمامی گروه‌ها به‌طور معنی‌دار افزایش یافته است ($p<0.05$).

مقایسه تیمارها نشان می‌دهد در تمامی زمان‌ها بیشترین تعداد باکتری‌ها در گروه کنترل مشاهده می‌شود که به‌طور معنی‌دار بالاتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

کمترین تعداد باکتری‌ها در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگبو به همراه CMC مشاهده شده است که به‌طور معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

با افزایش دوز عصاره برگبو در پوشش‌دهی با عصاره برگبو به تنها یک و یا در زمانی که از CMC به همراه عصاره استفاده شده است یک روند کاهش وابسته به دوز عصاره مشاهده می‌شود.

تفاوت معنی‌دار بین تیمارهای مختلف استفاده شده از عصاره برگبو وجود ندارد. همچنین بین تیمارهای دریافت کننده غلظت‌های مختلف عصاره برگبو به همراه CMC وجود ندارد اما در هر دو صورت از نظر عددی کمترین میزان باکتری در تیماری دیده می‌شود که از بالاترین غلظت استفاده کرده است.

شمارش باکتری‌های انتروباکتریاسه

شمارش باکتری‌های متعلق به خانواده انتروباکتریاسه در ابتدای مطالعه در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معنی‌دار نداشت. با گذشت زمان تعداد باکتری‌های انتروباکتریاسه در تمامی گروه‌ها به‌طور معنی‌دار افزایش یافته است ($p<0.05$). مقایسه تیمارها نشان می‌دهد در تمامی زمان‌ها بیشترین تعداد باکتری‌های انتروباکتریاسه در گروه کنترل مشاهده می‌شود که به‌طور معنی‌دار بالاتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

کمترین تعداد باکتری‌های انتروباکتریاسه در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگبو به همراه CMC مشاهده شده است که به‌طور معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p<0.05$).

با افزایش دوز عصاره برگبو در پوشش‌دهی با عصاره برگبو به تنها یک و یا در زمانی که از CMC به همراه عصاره استفاده شده است یک روند کاهش وابسته به دوز عصاره مشاهده می‌شود.

گروه‌های پوشش دار شده با CMC و عصاره جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه کمتری نسبت به تیمارهای پوشش دارشده با CMC یا عصاره نشان داده‌اند ($p<0.05$). اگرچه اختلاف آماری بین گروه‌های مختلف پوشش دار شده با ترکیب CMC و عصاره مشاهده می‌شود اما گروه‌هایی که فقط از دوزهای مختلف عصاره استفاده کرده‌اند تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. تغییرات جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه



نمودار ۴. (شمارش باکتری‌های انتروباکتریاسه): مقایسه میانگین تغییرات جمعیت باکتری‌های انتروباکتریاسه در گروه‌های مختلف در طول زمان ۱۲ روز نگهداری در دمای یخچال

آبی روش: زمان شروع مطالعه، قرمز: پس از ۴ روز، سبز: پس از ۸ روز و بنفش: پس از ۱۲ روز را نشان می‌دهد. در تمامی گروه‌ها با افزایش مدت زمان نگهداری، تعداد باکتری‌های متعلق به خانواده انتروباکتریاسه به صورت معنی‌دار افزایش یافت. کمترین تعداد باکتری‌های انتروباکتریاسه در گروه پوشش داده شده با ۴ درصد عصاره برگبو به همراه CMC (گروه ۵) مشاهده شده است که به صورت معنی‌دار کمتر از سایر گروه‌ها است ($p < 0.05$).

برخی فیلم‌ها و پوشش‌ها که تاکنون در مورد آنها پژوهش انجام گرفته است عبارتند از فیلم کازئینات کلسیم و سدیم، ایزوله پروتئین نخود، پوشش ژلاتین، کیتوزان، فیلم خوارکی پروتئین شیر، و ایزوله پروتئین سویا. در خصوص کاربرد پوشش کربوکسی متیل سلولز در فرآورده‌های گیاهی گزارش‌های متعددی موجود است اما در زمینه استفاده از کربوکسی متیل سلولز به عنوان پوشش خوارکی در فرآورده‌های پروتئینی تنها چند گزارش محدود داخلی وجود دارد و گزارش مشابه‌ای از خارج کشور موجود نمی‌باشد. محظوظ و همکاران به بررسی اثر پوشش CMC حاوی اسانس دارچین و میخک بر ماندگاری گوشت‌گوساله در شرایط یخچال پرداختند و گزارش دادند که نمونه‌های پوشش دار شده در مقایسه با گروه کنترل؛ میزان pH، ازت فرار، پراکسید، TBARs و شمارش کلی میکروبی کمتری را نشان دادند و این روند وابسته به دوز اسانس‌های مورد استفاده می‌باشد (۱۴). در مطالعه‌ای دیگر، صداقت و همکاران در سال ۱۳۹۳ به بررسی خواص خدمیکروبی پوشش CMC حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر ماندگاری گوشت‌گوسفتند در یخچال پرداختند و گزارش نمودند که این پوشش خوارکی باعث کاهش بار میکروبی سودوموناس، استافیلوکوکوس و کلی فرم‌ها می‌شود اما در زمانی که به همراه اسانس گشنیز، لیموترش استفاده شود اثرات خدمیکروبی تشدید می‌گردد (۱۵). همچنین در مطالعه دیگری مجتبی رئیسی و

• بحث

در فرآورده‌های گوشتی استفاده از پوشش‌ها و فیلم خوارکی نه تنها می‌تواند سلامت محصول را بهبود بخشد، بلکه مانع از افت رطوبت در مدت نگهداری گوشت نیز می‌گردد و همچنین طعم و بوی محصول را نیز کنترل می‌کند. گوشت تازه، به فساد ناشی از رشد میکروبی و واکنش‌های اکسیداسیون بسیار حساس است و میزان بالای پروتئین و رطوبت، سبب فساد میکروبی گوشت می‌شود. کاهش رشد میکروبی و تأخیر در اکسیداسیون لیپید و پروتئین در طول نگهداری می‌تواند منجر به افزایش ماندگاری گوشت شود (۱).

لذا به کار بردن مقادیر کنترل شده مواد خدمیکروب و ضد اکسیدان طبیعی در پوشش‌های خوارکی گوشت می‌تواند باعث افزایش زمان ماندگاری ماده غذایی گردد. با توجه به مصرف بالای گوشت مرغ و نیز مستعد بودن آن به فساد شیمیایی و میکروبی و از سوی دیگر، مسائل زیست محیطی انتخاب ترکیب‌های گیاهی بسیار مورد تولید کننده و مصرف کننده می‌باشد، هدف از انجام این مطالعه ایجاد پوشش خوارکی برای محافظت از گوشت مرغ تازه در مقابل رشد عوامل میکروبی و نیز بهبود ویژگی‌های ضد اکسیدانی آن و کنترل عوامل شیمیایی مؤثر بر روند فساد گوشت مرغ با افودن سطوح مختلف عصاره برگبو بوده است.

مقادیر پایین TVB-N و PV می‌تواند به دلیل کاهش جمعیت باکتریایی یا کاهش توانایی باکتری‌ها برای د-آمیناسیون اکسیداتیو ترکیبات نیتروژن‌دار غیرپروتئینی و یا هر دو مورد باشد (۱). فاکتور TVB-N در تیمارهای مختلف و در ماندگاری‌های مختلف در طول مطالعه نسبت به گروه کنترل، همواره کمتر بود. این موضوع نشان می‌دهد که پوشش کربوکسی متیل سلولز به ویژه همراه با عصاره برگ‌بو تا حدود زیادی قادر به جلوگیری از ایجاد و توسعه ترکیبات آمیزی عامل فساد در گوشت مرغ می‌باشد (۱۷).

نتایج نشان می‌دهد که پوشش دهی با CMC و عصاره برگ‌بو به خوبی توانسته است اکسیداسیون را در گوشت مرغ کاهش دهد. به نظر می‌رسد پوشش CMC مانع از رسیدن اکسیژن لازم برای پدیده اکسیداسیون می‌شود. کاهش میزان شاخص TBARs با اضافه نمودن پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره برگ‌بو نشان می‌دهد که این پوشش خوارکی قادر است با افزایش فعالیت ضد اکسیدانی مانع از تشکیل عوامل اکسیدان شود به طوری که مقایسه تیمارهای مختلف نشان می‌دهد بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی و ضد میکروبی در پوشش خوارکی CMC به همراه ۴ درصد عصاره برگ‌بو دیده می‌شود. عصاره برگ‌بو حاوی ترکیبات فولیک می‌باشد که دارای فعالیت ضد اکسیدانی قوی هستند. مهمترین ترکیب موجود در برگ‌بو سینئول است که قابلیت ضد اکسیدانی بالایی دارد. فعالیت ضد اکسیدانی سینئول در مطالعات مختلف اثبات شده است. نقش محافظتی سینئول در مقابل عوامل اکسیدان به مهار گونه‌های فعال اکسیژن و مهار پراکسیداسیون چربی نسبت داده شده است (۱۷).

اگرچه در خصوص استفاده از CMC در پوشش خوارکی گوشت تحقیقات چندانی صورت نگرفته است اما در مطالعات قبلی، پوشش دهی محصولات پروتئین حیوانی با انواع مختلفی از پوشش‌ها نشان از محافظت از گوشت در مقابل اکسیداسیون بوده است. توریان و امیری (۱۳۹۸) با به کارگیری پوشش خوارکی کیتوzan با کنسانتره از گیل و اسانس زنجبل به تنها بی و در ترکیب با یکدیگر باعث کاهش فساد شیمیایی و افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچال شوند (۲). در تحقیق دیگری حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۸) به ارزیابی اثر پوشش کیتوzan حاوی غلظت‌های مختلف انسانس کاکوتی کوهی در مقایسه با گروه شاهد بر برخی خصوصیات حسی و میکروبی فیله‌مرغ در طول ۱۲ روز نگهداری در دمای یخچال (۴ درجه سانتی‌گراد) پرداختند و نشان دادند پوشش کیتوzan حاوی ۵/۰ درصد اسانس کاکوتی کوهی پتانسیل افزایش زمان نگهداری فیله‌های مرغ را بدون ایجاد خصوصیات حسی

همکاران به بررسی اثر ضد میکروبی پوشش CMC حاوی اسانس آویشن شیرازی و عصاره دانه‌انگور بر گوشت ماهی قزل‌آلاء پرداختند و بیان کردند این پوشش ترکیبی می‌تواند فساد میکروبی گوشت قزل‌آلاء را به تأخیر بیندازد (۱۶). همچنین شعبانی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات نمودند، پودر بره‌موم جهت نگهداری طولانی مدت همبرگر ماهی به صورت یک نگهدارنده طبیعی قابل استفاده است و جهت تولیدات صنعتی می‌تواند، کاربرد داشته باشد (۵).

pH تغییرات

افزایش pH در طی روند نگهداری گوشت می‌تواند ناشی از فعالیت آنزیم‌های میکروبی یا اندوزن مانند پروتئازها و لیپاز باشد که منجر به تخریب بافت گوشت و افزایش بازهای فرار طی نگهداری طولانی مدت می‌شود. در مطالعه حاضر نیز با افزایش مدت نگهداری گوشت مرغ میزان pH در گروه کنترل به طور معنی‌دار افزایش یافته است که می‌تواند بدلیل افزایش فعالیت میکروبی و شیمیایی با گذشت زمان باشد اما میزان افزایش pH با افزودن سطوح مختلف عصاره برگ‌بو در ماندگاری‌های مختلف، نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌دار کمتر بوده است ($p < 0.05$). کمتر بودن میزان pH در ماندگاری‌های مختلف در تیمارهای مختلف آزمایشی ممکن است بدلیل اثر مهاری پوشش خوارکی یا عصاره برگ‌بو بر فعالیت میکروبی و ممانعت از تخریب بافت گوشت باشد. در همین راستا، در مطالعه بازرگانی و همکاران (۲۰۱۵) نشان داده شده است که pH نمونه‌های کنترل در طول نگهداری افزایش یافته است، در حالی که سایر نمونه‌ها روند کاهشی نشان دادند که به علت وجود تیمارهای ضد میکروبی اسیدی شده مانند عصاره انار، کیتوzan و اسانس آویشن شیرازی بوده است اما در مطالعه اخیر با توجه به مهار فعالیت میکروبی و از طرفی خنثی بودن عصاره برگ‌بو و CMC، در ماندگاری‌های مختلف تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌های تیمارشده با درصد های مختلف عصاره برگ‌بو همراه یا بدون CMC مشاهده نمی‌شود (۱).

ویژگی‌های اکسیداسیون

پراکسیدها نمایانگر محصولات اول اکسیداسیون و تشکیل مالون دی آبدئید نمایانگر محصولات ثانویه اکسیداسیون می‌باشد. مقایسه تیمارهای مختلف نشان می‌دهد با افزایش ماندگاری گوشت، میزان پراکسید در گروه کنترل افزایش می‌یابد و پوشش دهی با CMC به همراه عصاره برگ‌بو نیز به طور کامل نمی‌تواند مانع از افزایش میزان پراکسید شود اما پوشش دهی باعث می‌شود که در تمامی تیمارها میزان پراکسید تولید شده کمتر از گروه کنترل باشد.

خوارکی با عصاره‌های گیاهی با خاصیت ضدبacterی نیز اثرات مشابه گزارش شده است.

توریان و همکاران گزارش کردند که در تیمارهای پوشش‌داده شده با کیتوزان حاوی اسانس زنجبیل ۲ درصد و کنسانتره از گیل شمارش شاخص‌های میکروبی ذکر شده در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است (۲۰). همچنین نتایج مطالعه حسن‌زاده و همکاران نشان داد که در تیمارهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی اسانس کاکوتی‌کوهی شمارش شاخص‌های میکروبی مذکور در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی‌داری در طول دوره نگهداری کاهش یافته است (۱۸). علاوه بر این، حکیم و همکاران نشان دادند در تمام نمونه‌ها با گذشت زمان، شمارش کلی باکتری‌های مزووفیل و ساکروفیل به‌شکل معنی‌داری افزایش یافت ولی این افزایش در نمونه‌های کیتوزان و اسانس پونه‌کوهی به‌شکل معنی‌داری کمتر بوده است (۲۳). عابدینی و همکاران (۱۳۹۳) بیان کردند مقادیر شاخص‌های اکسیداسیون و باکتریایی تیمارهای حاوی پوشش کیتوزان و عصاره رزماری در مقایسه با تیمار شاهد، تغییرات کمتری طی دوره نگهداری داشتند (۲۴).

خاصیت ضدمیکروبی عصاره برگبو که به سینئول یا اکالیپتوں نسبت داده می‌شود می‌تواند از طریق اثرگذاری بر ساختار دیواره سلول باکتری باشد. از طرفی، با تأثیر بر آنزیم‌های مسئول تولید انرژی می‌تواند خاصیت ضدمیکروبی را بروز دهد (۲۵). با پوشش‌دهی گوشت و مهار فعالیت باکتری‌ها روند تخریب بافت و تولید ترکیبات ازته نیز کاهش می‌یابد و شاخص‌های اکسیداسیون مانند TBARs و پراکسید کاهش می‌یابد.

قبلًا محققین دیگر پوشش‌های خوارکی حاوی اسانس پونه، آویشن، برگلیمو و دارچین، عصاره‌انگور و سیر را مانع رشد اشريشيا کلی عنوان کردند. این مطالعه بیان‌گر این است که ترکیبات ضدمیکروبی از پوشش مهاجرت و از رشد میکرووارگانیسم جلوگیری می‌کنند.

نتیجه گیری

به‌طور کلی، مطالعه اخیر اثبات نمود، پوشش‌دهی گوشت مرغ با CMC و عصاره برگبو، در مقایسه با نمونه‌های گوشت بدون پوشش می‌تواند در افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه مرغ در یخچال به‌صورت معنی‌داری، مؤثر باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، که این اثر وابسته به دوز عصاره برگبو می‌باشد و در دوز ۴٪ بیشترین خاصیت ضدمیکروبی و ضد اکسیدانی مشاهده می‌شود، لذا بهره‌گیری از این ترکیبات در گوشت‌های بسته‌بندی آماده طبخ می‌تواند نیمه عمر استفاده از این محصولات را با اثر ممانع‌تی بر رشد باکتری‌ها و همچنین کاهش میزان pH، ازت

نامطلوب دارد (۱۸). همچنین Xiong و همکاران (۲۰۲۰) ترکیب نیسین و عصاره دانه‌انگور در پوشش خوارکی کیتوزان-ژلاتین و تأثیر آن بر نگهداری سرد گوشت‌خوک تازه را بررسی کردند و نشان دادند که ۱ درصد کیتوزان به‌طور مؤثر از اکسیداسیون گوشت‌خوک و فساد میکروبی جلوگیری می‌کند (۱۹). علاوه‌بر این، Arrieta و همکاران (۲۰۱۳) تأثیر پوشش ژلاتین بر عمر ماندگاری گوشت تازه را بررسی کردند و نشان دادند ژلاتین در فرآورده‌های بسته‌بندی شده تحت خلاء مؤثرتر از بسته‌بندی با وجود اتمسفر است (۲۰).

Zhang و همکاران (۲۰۱۸) گزارش نمودند که پوشش خوارکی بر پایه کیتوزان و سرکه بامبو در گوشت‌خوک با مهار افزایش مقادیر TBARs، باعث کاهش اکسیدشدن لیپیدها می‌شود (۲۰).

همچنین، در مقالاتی دیگر گزارش شده است که اندیس اسیدتیوباریتوريک و پراکسید در نمونه‌های گوشت تیمارشده با عصاره‌سماق و پوشش کیتوزان غنی‌شده با اسانس آویشن-شیرازی نسبت به گروه کنترل بالاتر شده است (۳). افزودن ضد اکسیدان‌های طبیعی و شیرین‌بیان در ناگات‌های گوشت طی ۱۲۰ روز باعث کاهش مقادیر TBARs می‌شود (۲۱). گوشت خوک پوشش داده شده با اسانس رازیانه/نانومولسیون سینامالدید کمترین اندیس TBARs و محتوا TVB-N را نشان می‌دهد (۴).

اکسیداسیون یکی از عوامل اصلی فساد مواد غذایی است که منجر به کاهش کیفیت و عدم ذائقه پسندی مصرف کننده می‌شود. بنابراین، یک پوشش خوارکی با ضد اکسیدان طبیعی می‌تواند از طریق جلوگیری از اکسیداسیون چربی، ماندگاری محصولات گوشتی را افزایش دهد. محصولات طبیعی با فعالیت ضد اکسیدانی قابل توجه به‌دلیل محتوا ترکیبات فعال که می‌تواند فساد مواد غذایی را در طول ذخیره‌سازی کاهش دهنده، پتانسیل خوبی برای استفاده در صنعت گوشت دارد (۲۲).

فعالیت ضد میکروبی

نتایج مطالعه اخیر نشان داد اگرچه استفاده از پوشش خوارکی CMC نمی‌تواند به‌صورت کامل مانع از رشد تصاعدی میکروب‌ها شود اما استفاده همزمان از CMC و عصاره برگبو مانع از رشد باکتری‌های فلور گوشت می‌شود. به‌نظر می‌رسد پوشش خوارکی با آزادسازی تدریجی مواد مؤثره برگبو مانع از رشد باکتری‌ها شود به‌طوریکه قبلًا خواص ضدبacterیایی برگبو بر باکتری‌های با منشأ غذا مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مهاری مواد مؤثره مانند سینئول بر استافیلکوکوس و اشريشيا کلی گزارش شده است. علاوه‌بر آن، در ترکیب سایر پوشش‌های

سپاسگزاری

تحقیق حاضر در راستای بخشی از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوستر، خوزستان انجام شده است. بدینوسیله نویسنده‌گان مراتب سپاس خود را از همکاری مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی شوستر و بهبهان اعلام می‌دارند.

• References

- Bazorgani B, Tajik H, Akbarlo J, Kholgi D. Antimicrobial effects of pomegranate juice along to chitosan containing Zataria multiflora Boiss essential oil on the frozen chicken meat. *Journal of Food Research*, 2016; 26(1): 75-85. [in Persian].
- Tooryan F, Amiri MR. Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage of Chicken Fillet Coated with Chitosan, Ginger Essential Oil (*Zingiber officinale*) and Medlar concentrate (*Mespilus germanica* L.) during refrigerated storage. *Research and Innovation in Food Science and Technology*, 2020; 8(4): 391-404. doi: 10.22101/JRIFST.2019.16.10.e1104. [in Persian].
- Langroodi AM, Tajik H, Mehdizadeh T, Moradi M, Kia EM, Mahmoudian A. Effects of sumac extract dipping and chitosan coating enriched with Zataria multiflora Boiss oil on the shelf-life of meat in modified atmosphere packaging. *Lwt*. 2018 Dec 1;98:372-80.
- Su HP, Lien CP, Lee TA, Ho JH. Development of low-fat mayonnaise containing polysaccharide gums as functional ingredients. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2010 Apr 15;90(5):806-12.
- Shabani, M., Mokhtarian, M., Kalbasi-Ashtari, A. and Kazempoor, R. 2021. Effects of extracted propolis (*Apis mellifera*) on physicochemical and microbial properties of rainbow-trout fish burger patties. *Journal of Food Processing and Preservation*, <https://doi.org/10.1111/jfpp.16027> [in Persian].
- Kiarsi Z, Hojjati M, Behbahani BA, Noshad M. In vitro antimicrobial effects of *Myristica fragrans* essential oil on foodborne pathogens and its influence on beef quality during refrigerated storage. *Journal of Food Safety*. 2020 Jun;40(3):e12782.
- Abdullah Ghasemi A. Medicinal and aromatic plants (recognition and their effects). Islamic Azad University Shahrekhord Branch. Press; 2011. p. 10-136 [in Persian].
- Batool S, Khera RA, Hanif MA, Ayub MA. Bay Leaf. *Medicinal Plants of South Asia*. 2020:63-74. doi: 10.1016/B978-0-08-102659-5.00005-7.
- Gholami-Ahangaran M, Rangsaz N, Azizi S. Evaluation of turmeric (*Curcuma longa*) effect on biochemical and pathological parameters of liver and kidney in chicken aflatoxicosis. *Pharmaceutical biology*. 2016 May 3;54(5):780-7.
- Guo X, Chen B, Wu X, Li J, Sun Q. Utilization of cinnamaldehyde and zinc oxide nanoparticles in a carboxymethylcellulose-based composite coating to improve the postharvest quality of cherry tomatoes. *International Journal of Biological Macromolecules*. 2020 Oct 1;160:175-82.
- Fرار، پراکسید و TBARs در طول دوره‌ی نگهداری گوشت، باعث افزایش زمان نیمه‌عمر گوشت مرغ در شرایط یخچال می‌شود. در نتیجه، در حفظ کیفیت بهداشتی گوشت مرغ تا زمان طبخ مؤثر باشد.
- Khan MI, Adrees MN, Tariq MR, Sohaib M. Application of edible coating for improving meat quality: A review. *Pakistan journal of food sciences*. 2013;23(2):71-9.
- Musso YS, Salgado PR, Mauri AN. Smart edible films based on gelatin and curcumin. *Food hydrocolloids*. 2017 May 1;66:8-15.
- Arrieta MP, Peltzer MA, del Carmen Garrigós M, Jiménez A. Structure and mechanical properties of sodium and calcium caseinate edible active films with carvacrol. *Journal of Food Engineering*. 2013 Feb 1;114(4):486-94.
- Kamkar A, Khanjari A, Oladi M, Moulay Aghaei I. The effect of packaging with chitosan film containing black cumin essential oil on the chemical and microbial characteristics of chicken fillet. *Journal of Fasa University of Medical Sciences*. 2017 Mar 1;7(1). [in Persian].
- Sedaghat N, Mohammad Hosseini M, Khoshnoudi-nia S, Habibi Najafi M, Koocheki A. Antimicrobial Properties of CMC-based Edible Films Incorporated with Coriander and Citrus Lemon Essential oils on the Shelf-life of Fresh Lamb-meat at Refrigerator Temperature. *Iranian J Nutr Sci Food Technol* 2015; 9 (4) :53-62 [in Persian].
- Raeisi M, Tajik H, Aliakbarlu J, Mirhosseini SH, Hosseini SM. Effect of carboxymethyl cellulose-based coatings incorporated with Zataria multiflora Boiss. essential oil and grape seed extract on the shelf life of rainbow trout fillets. *LWT-Food Science and Technology*. 2015 Dec 1;64(2):898-904.
- Domínguez R, Pateiro M, Gagaoua M, Barba FJ, Zhang W, Lorenzo JM. A comprehensive review on lipid oxidation in meat and meat products. *Antioxidants*. 2019 Sep 25;8(10):429.
- Hassanzadeh P, Tajik H, Razavi Rohani M. Application of chitosan edible coating containing grape seed extract on the quality and shelf life of refrigerated chicken meat. *Journal of Food Research*, 2012; 21(4): 467-482. [in Persian].
- Xiong Y, Chen M, Warner RD, Fang Z. Incorporating nisin and grape seed extract in chitosan-gelatine edible coating and its effect on cold storage of fresh pork. *Food Control*. 2020 Apr 1;110:107018.
- Zhang H, He P, Kang H, Li X. Antioxidant and antimicrobial effects of edible coating based on chitosan and bamboo vinegar in ready to cook pork chops. *Lwt*. 2018 Jul 1;93:470-6.
- de Paiva GB, Trindade MA, Romero JT, da Silva-Barreto AC. Antioxidant effect of acerola fruit powder, rosemary and licorice extract in caiman meat nuggets containing mechanically separated caiman meat. *Meat Science*. 2021 Mar 1;173:108406.
- Vital AC, Santos NW, Matumoto-Pintro PT, da Silva Scapim MR, Madrona GS. Ice cream supplemented with

- grape juice residue as a source of antioxidants. International Journal of Dairy Technology. 2018 Feb;71(1):183-9.
23. Kiani Ghaleh Sard S, Fazlara A, Ghaderi Ghahfarokhi M, Pourmahdi Brujeni M. The investigation of coated fresh chicken fillet quality with carrageenanMentha longifolia essential oil under modified atmosphere packaging. Journal of Veterinary Microbiology. 2022 44: 1-19 [in Persian].
24. Abedini V, Aryaei P, Sharifzadeh M. Investigating the effect of the combination of chitosan and rosemary extract on increasing the shelf life of chicken meat at refrigerator temperature. The fourth national food security conference. 2014: 4(1) [in Persian].
25. Salehi B, Stojanović-Radić Z, Matejić J, Sharifi-Rad M, Kumar NV, Martins N, Sharifi-Rad J. The therapeutic potential of curcumin: A review of clinical trials. European journal of medicinal chemistry. 2019 Feb 1;163:527-45.

A Survey on the Antimicrobial Effects of Carboxymethylcellulose Coatings with Bay Leaf Extracts and Their Effects on Increasing Shelf life of Chicken Meats

Hafezi¹ B, Ghasemian O^{2*}, Gharib Mombeni E¹

1- Department of Veterinary, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.

2- *Corresponding Author: Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.
Email: Ghasemian1249@yahoo.com

Received 24 Jan, 2024

Accepted 26 Apr, 2024

Background and Objectives: Use of food coatings as a modern technology, in addition to their compatibility with the environment, non-toxicity and usability, protects foods from physical, chemical and biological damages. In this study, antioxidant and antimicrobial effects of carboxymethyl cellulose edible coating with ethanolic extracts of bay leaves were assessed on the shelf life of chicken meats.

Materials & Methods: Slices of breast meats were prepared in eight treatments with three repetitions to investigate effects of carboxymethyl cellulose with a concentration of 2% alone and with the extract of bay leaves with concentrations of 1, 2 and 4% on the total microbial load. Then, bacterial populations of Enterobacteriaceae and antioxidant indices of TBARS, TVB-N and peroxide index were analyzed. Indicators were assessed at the beginning of the study and 4, 8 and 12 d after coating at refrigerator temperature.

Results: Results showed that at the beginning of the study, the various treatments did not show statistical differences in the indicators. With increases of time in all groups, the microbial load and population of Enterobacteriaceae increased. In addition, oxidant indices showed increases over time. Statistical analysis of the findings showed that in all times, the highest microbial load and oxidant indices belonged to the control group and the group coated with carboxymethyl cellulose alone with no statistical differences at all times. In addition, the lowest microbial load and oxidant indices were observed in groups receiving the edible coating with the extract. In this group, 4% concentration of bay leaf extract showed the greatest decreases in the microbial load as well as oxidant and peroxidative indices in chicken meats.

Conclusion: It seems that the simultaneous use of bay leaf extract and carboxymethyl cellulose can be effective in increasing the half-life of chicken meats under refrigerator conditions and preserving health quality of the chicken meats until cooking.

Keywords: Chicken meat, Coating, Carboxymethylcellulose, Bay leaf, *Laurus nobilis*